

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、  
心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、  
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：1106  
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：護理師

科 目：基礎醫學（包括解剖學、生理學、病理學、藥理學、微生物學與免疫學）

考試時間：1 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 皮膚上所見到的雞皮疙瘩現象，與下列何者較無關係？  
(A)豎毛肌收縮 (B)交感神經興奮 (C)副交感神經興奮 (D)天氣寒冷
- 下列那一個腺體之組織學特徵具有膠體（colloid）的構造？  
(A)松果腺 (B)腎上腺 (C)甲狀腺 (D)副甲狀腺
- 下列何者可使眼球向下內側看及向內旋轉？  
(A)上直肌（superior rectus） (B)下直肌（inferior rectus）  
(C)上斜肌（superior oblique） (D)下斜肌（inferior oblique）
- 下列頭顱骨骼，何者負責與頸椎形成關節？  
(A)枕骨 (B)顱骨 (C)蝶骨 (D)篩骨
- 有關兩性骨盆的比較，下列何者男性大於女性？  
(A)骨盆入口的寬度 (B)恥骨弓的夾角 (C)骨盆出口的寬度 (D)真骨盆的深度
- 正常情形下，白血球中數量最多與直徑最大的分別是：  
(A)嗜中性球與嗜酸性球 (B)嗜中性球與單核球  
(C)淋巴球與嗜酸性球 (D)淋巴球與單核球
- 下列何者直接由升主動脈分支出？  
(A)冠狀動脈 (B)支氣管動脈 (C)食道動脈 (D)前肋間動脈
- 下列有關男性生殖器官的敘述，何者錯誤？  
(A)曲細精管可以產生精子 (B)精囊儲存並促使精子成熟  
(C)輸精管穿過腹股溝管進入骨盆腔 (D)前列腺位在恥骨聯合的後面，膀胱的下方
- 用力吸氣增大胸腔容積時，與下列何者的收縮無關？  
(A)腹肌 (B)橫膈 (C)外肋間肌 (D)斜角肌
- 關於子宮的敘述，下列何者正確？  
(A)子宮肌層是由骨骼肌形成 (B)子宮血液供應主要來自髂外動脈的分枝  
(C)子宮圓韌帶幫助子宮維持前傾 (D)子宮內膜之基底層會於月經期剝落而排出
- 下列何者的內襯上皮不是單層柱狀？  
(A)胃 (B)十二指腸 (C)食道 (D)降結腸
- 下列何者分別與食道及十二指腸相接？  
(A)胃體部與胃底部 (B)胃底部與幽門部 (C)賁門部與幽門部 (D)胃體部與賁門部
- 下列那兩種皆屬於腹膜後器官？  
(A)脾臟與肝臟 (B)胰臟與升結腸 (C)橫結腸與降結腸 (D)盲腸與乙狀結腸

- 14 支配骨骼肌的運動神經元細胞體是位於脊髓的何處？  
(A)白質外側柱 (B)白質前柱 (C)灰質外側角 (D)灰質前角
- 15 負責調節眼球晶狀體曲度的神經是：  
(A)視神經 (B)眼神經 (C)動眼神經 (D)滑車神經
- 16 下列何者屬於邊緣系統？  
(A)海馬 (B)黑質 (C)松果腺 (D)基底核
- 17 鈉鉀幫浦 (sodium-potassium pump) 運送鈉鉀離子的作用方式屬於下列何者？  
(A)簡單擴散 (simple diffusion) (B)主動運輸 (active transport)  
(C)滲透 (osmosis) (D)胞噬作用 (endocytosis)
- 18 下列那些肌細胞有明顯的明暗相間之橫紋構造？  
(A)骨骼肌、心肌與平滑肌 (B)骨骼肌與心肌  
(C)心肌與平滑肌 (D)平滑肌與骨骼肌
- 19 下列何種細胞特性為骨骼肌特有，心肌與平滑肌則無？  
(A)橫小管 (transverse tubule) (B)肌漿網 (sarcoplasmic reticulum)  
(C)多核 (multiple nuclei) (D)旋轉素 (troponin)
- 20 下列何種神經傳遞物質，生成後並不儲存於突觸囊泡內？  
(A)一氧化氮 (B)麩胺酸 (C)正腎上腺素 (D)乙醯膽鹼
- 21 動作電位過極化時：  
(A)鈉離子流入細胞內，鉀離子流出細胞外 (B)鈉離子流入細胞內，鉀離子難以通過細胞膜  
(C)鈉離子難以通過細胞膜，鉀離子流出細胞外 (D)鈉、鉀離子皆難以通過細胞膜
- 22 某人出現咀嚼困難、臉頰喪失觸覺等症狀。此人最可能受損的腦神經是：  
(A)滑車神經 (B)三叉神經 (C)顏面神經 (D)迷走神經
- 23 因自體免疫而破壞所有腎上腺皮質組織時，下列何者生合成受影響？  
(A)腎上腺糖皮質激素與去甲基腎上腺素 (正腎上腺素)  
(B)腎上腺鹽皮質激素與腎上腺素  
(C)腎上腺糖皮質激素與雄激素  
(D)腎上腺鹽皮質激素與雌激素
- 24 下列何者因分泌持續增加而使骨質密度增加？  
(A)降鈣素 (B)糖皮質激素 (C)甲狀腺素 (D)副甲狀腺素
- 25 於雌性生殖細胞中，何者具單套 23 條成對之染色體？  
(A)卵原細胞 (B)初級卵母細胞 (C)次級卵母細胞 (D)卵細胞
- 26 迷走神經末梢分泌之乙醯膽鹼 (acetylcholine) 可以使心跳速率減慢，其原因為促使心臟節律性細胞 (pacemaker cell)：  
(A)增加對鈉離子的通透性 (B)增加對鉀離子的通透性  
(C)減少對鉀離子的通透性 (D)減少對鈉離子的通透性
- 27 在正常的心電圖中，QRS 複合波是因下列何者產生的？  
(A)心房的去極化 (depolarization) (B)心房的再極化 (repolarization)  
(C)心室的去極化 (D)心室的再極化
- 28 下列何者會導致腎絲球過濾率 (glomerular filtration rate) 下降？  
(A)入球小動脈 (afferent arteriole) 擴張 (B)出球小動脈 (efferent arteriole) 收縮  
(C)血中白蛋白 (albumin) 濃度增加 (D)超過濾膜 (ultrafiltration membrane) 通透性增加

- 29 對於直接調控腎臟皮質集尿管 (collecting duct) 上皮細胞對水的通透性，下列何者能力最強？  
(A)血管加壓素 (vasopressin) (B)腎素 (renin)  
(C)血管張力素 (angiotensin) (D)腎上腺皮質素 (corticosteroid)
- 30 去玉山旅遊時，由於氧分壓不足，因而引起呼吸加快，在此情況下，何種生理反應最可能伴隨發生？  
(A)二氧化碳濃度升高、pH 值降低 (B)二氧化碳濃度降低、pH 值降低  
(C)二氧化碳濃度升高、pH 值增大 (D)二氧化碳濃度降低、pH 值增大
- 31 在紅血球中，下列何者是催化二氧化碳與水結合形成碳酸最重要的酵素？  
(A)碳酸酐酶 (carbonic anhydrase) (B)乳糜蛋白酶 (chymotrypsin)  
(C)肌凝蛋白輕鏈激酶 (myosin-light chain kinase) (D)阿爾發澱粉酶 (alpha amylase)
- 32 小腸上具備有免疫功能的細胞位在何處？  
(A)派亞氏結區 (Peyer's patches) (B)乳糜管 (lacteal)  
(C)腸上皮細胞 (enterocyte) (D)杯狀細胞 (goblet cell)
- 33 下列何者不是可逆性細胞損傷的變化？  
(A)細胞膜呈泡狀凸出 (B)粒線體腫脹 (C)內質網之擴張 (D)細胞核崩裂
- 34 下列那一器官遭受到可逆性傷害時，最常以脂肪變性 (fatty change) 來呈現？  
(A)肺 (B)肝 (C)腎 (D)脾
- 35 肺循環血栓栓塞 (pulmonary thromboembolism) 主要是塞在何部位？  
(A)肺動脈 (B)肺靜脈 (C)肺泡 (D)肺淋巴管
- 36 下列那一種人類白血球抗原 (human leukocyte antigen, HLA) 專屬於抗原呈現細胞 (antigen presenting cell)，允許 CD4 輔助性 T 細胞辨識外來抗原，產生免疫反應？  
(A) HLA-A (B) HLA-B (C) HLA-C (D) HLA-D
- 37 下列何種疾病的發生與抽菸的關係最少？  
(A)肺氣腫 (B)心肌梗塞 (C)甲狀腺癌 (D)肺癌
- 38 有關法洛氏四重症 (Tetralogy of Fallot) 的病理變化，何者錯誤？  
(A)心室中膈缺損 (B)主動脈跨騎在心室中膈缺損之上  
(C)左心室出口阻塞 (D)右心室肥大
- 39 心肌梗塞約在發生多久時，會在病灶中產生明顯纖維化？  
(A) 3~6 天 (B) 7~9 天 (C) 10~12 天 (D) 2~8 週
- 40 下列有關感染性單核球症 (infectious mononucleosis) 的敘述，何者錯誤？  
(A) Epstein-Barr 病毒所引起  
(B)病毒主要感染吞噬細胞  
(C)此類病人血液中的非典型淋巴細胞 (atypical lymphocytes) 是活化的 T 淋巴細胞  
(D)此類病人的症狀大多數在 4~6 週後消失
- 41 下列有關缺鐵性貧血 (iron deficiency anemia) 的診斷條件，何者錯誤？  
(A)平均紅血球色素值下降 (B)血鐵蛋白 (ferritin) 量低  
(C)攜鐵蛋白 (transferrin) 飽和度高 (D)平均紅血球體積降低
- 42 何謂波雷特氏食道 (Barrett esophagus)？  
(A)遠端食道潰瘍 (ulcer)  
(B)遠端食道狹窄 (stricture)  
(C)遠端食道鱗狀上皮發生腸化生 (intestinal metaplasia)  
(D)遠端食道鱗狀上皮過度增生 (hyperplasia)

- 43 有關克隆氏疾病 (Crohn disease) 的臨床病理特徵，下列敘述何者正確？  
(A) 易出現乾酪性肉芽腫 (caseating granuloma)  
(B) 發生大腸癌的機會比潰瘍性大腸炎 (ulcerative colitis) 大  
(C) 與潰瘍性大腸炎不同的是，不會有腸道以外的免疫疾病發生  
(D) 比潰瘍性大腸炎易發生腸道狹窄的後遺症
- 44 卵巢甲狀腺腫 (struma ovarii) 是屬於一種：  
(A) 畸胎瘤 (teratoma) (B) 絨毛膜癌 (choriocarcinoma)  
(C) 卵黃囊腫瘤 (yolk sac tumor) (D) 胚胎癌 (embryonal carcinoma)
- 45 急性腎盂腎炎 (acute pyelonephritis) 之病因為何？  
(A) 免疫反應 (B) 病毒感染 (C) 細菌感染 (D) 基因突變
- 46 最常見到的乳房良性腫瘤為下列何項？  
(A) 脂肪瘤 (lipoma) (B) 纖維瘤 (fibroma)  
(C) 纖維腺瘤 (fibroadenoma) (D) 管內乳突瘤 (intraductal papilloma)
- 47 有關髓芽母細胞瘤 (medulloblastoma) 的敘述，下列何者錯誤？  
(A) 好發於老年人  
(B) 好發於小腦  
(C) 顯微鏡下，侯瑪盧愛氏玫瑰花形 (Homer Wright rosette) 是其特徵  
(D) 可隨腦脊髓液散播
- 48 波特氏病 (Pott disease) 與那種病變最有關係？  
(A) 梅毒 (B) 結核病 (C) 疱疹 (D) 猩紅熱
- 49 林先生因誤食農藥巴拉松 (parathion) 而被送醫急救，當抵達急診室時，林先生已出現意識模糊、瞳孔縮小、全身輕微抽搐等症狀，此時，進行下列何種處置最適當？  
(A) 應先採血送驗，確認血液生化值後再給藥救治  
(B) 因已意識模糊，應先注射 epinephrine 以防休克  
(C) 應先注射 pralidoxime 及 atropine  
(D) 應先注射 tubocurarine 以防橫膈痙攣
- 50 下列有關腎上腺素 (epinephrine) 的敘述，何者正確？  
(A) 是一種內生性的蛋白質，主要由腎上腺髓質所分泌  
(B) 在低劑量時，主要呈現  $\alpha$  腎上腺素受體 ( $\alpha$  adrenergic receptor) 的效應  
(C) 是治療第一型過敏反應 (type I hypersensitivity reaction) 的首選用藥  
(D) 會活化肝臟的  $\alpha_2$  腎上腺素受體 ( $\alpha_2$  adrenergic receptor) 而減少肝醣分解
- 51 吸入性全身麻醉劑的 MAC (minimal alveolar concentration) 數值越小，其所代表的意義為何？  
(A) 麻醉劑強度越大 (B) 麻醉劑強度越小 (C) 麻醉劑溶解度越低 (D) 腦部的吸收率越差
- 52 下列那一藥物適用於阿茲海默症之治療？  
(A) apomorphine (B) bromocriptine (C) galantamine (D) rotigotine
- 53 Carbidopa 與 levodopa 併用於巴金森氏症患者之治療，主要是因為 carbidopa 抑制下列何種酶所致？  
(A) 乙醯膽鹼酶 (acetylcholine esterase) (B) 多巴脫羧酶 (DOPA decarboxylase)  
(C) 多巴胺羧化酶 (dopamine beta-hydroxylase) (D) 單胺氧化酶 (monoamine oxidase)

- 54 下列用於 sleep disorders 之藥物，何者可明顯縮短入睡時間及減少睡眠中醒來次數，但會造成病人有白天中樞抑制（daytime sedation）之副作用？  
(A) clonazepam (B) diazepam (C) flurazepam (D) temazepam
- 55 下列何者不是服用 salicylates 所引起的副作用？  
(A)嘔吐 (B)幻覺 (C)代謝性鹼中毒 (D)耳鳴
- 56 神經內科病人陳述時常嚴重單側頭痛，確診後為偏頭痛（migraine）。其治療處方為 sumatriptan，可使腦血管收縮，緩解頭痛。此藥物為下列何種自泌素之致效劑（agonist）？  
(A)前列腺素（prostaglandin） (B)組織胺（histamine）  
(C)血清素（serotonin） (D)緩激肽（bradykinin）
- 57 下列抗心律不整藥物，何者可以降低動作電位第四期的去極化，而減少竇房結的自主性？  
(A) quinidine (B) sotalol (C) amiodarone (D) propranolol
- 58 下列降血壓藥物中，何者具有血管擴張作用，且臨床上可用於良性前列腺肥大症（BPH）？  
(A) prazosin (B) nadolol (C) verapamil (D) diazoxide
- 59 下列藥物何者是屬於治療氣喘之用藥？  
(A) terbutaline (B) cimetidine (C) dextromethorphan (D) propranolol
- 60 有關 paclitaxel 的敘述，下列何者錯誤？  
(A)可用來治療卵巢癌與乳癌  
(B)肝功能不全者應該調整劑量  
(C)副作用包括 neutropenia 與過敏反應  
(D)主要是屬於烷基化（alkylating）類藥物，會使 DNA 烷基化
- 61 下列何者為治療甲狀腺風暴（thyroid storm）之首選藥物？  
(A) propranolol (B) levothyroxine (C) prostaglandin (D) hydrocortisone
- 62 使用三合一療法（triple therapy）治療幽門桿菌引起的胃潰瘍，不包含下列何種藥物？  
(A) omeprazole (B) clarithromycin (C) erythromycin (D) amoxicillin
- 63 下列何者是抗生素 quinolones 藥物的作用機轉？  
(A)抑制細胞壁生成 (B)抑制蛋白質生成 (C)抑制葉酸生成 (D)抑制 DNA gyrase 作用
- 64 免疫抑制劑 sirolimus（又稱 rapamune）可緩解免疫組織損壞。此藥物在淋巴細胞作用之敘述，何者正確？  
(A)降低 calcineurin 的活性 (B)減少淋巴激素（IL-2）產生  
(C)抑制 mTOR，影響細胞週期 (D)抑制 purine 生成
- 65 主要辨識革蘭氏陰性菌的脂多糖（lipopolysaccharide）的細胞受體是那一種？  
(A) Fc 受體 (B) T 細胞受體  
(C) Toll-like receptor 4（TLR4） (D)抗體（Antibody）
- 66 下列分子可與 B7-1/B7-2（CD80/CD86）結合後，抑制 T 細胞活化的為：  
(A) CD28 (B) CTLA-4（CD152） (C) CD4 (D) CD2
- 67 下列何種細胞激素，可刺激嗜酸性白血球分泌媒介物，引起氣喘？  
(A) IL-1 (B) IL-5 (C) IL-15 (D) IL-12
- 68 人類血型為 A 型，其血中抗體為：  
(A)抗 A 抗體 (B)抗 B 抗體 (C)無抗體 (D)抗 A 及抗 B 抗體

- 69 婦女經期使用的衛生棉條不潔時，會引起毒性休克症候群，是下列何種細菌產生之毒素所引起的？  
(A)腦膜炎雙球菌 (*Neisseriae meningitidis*) (B) A 族性鏈球菌 (group A *Streptococcus*)  
(C)金黃色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*) (D)淋病雙球菌 (*Neisseriae gonorrhoeae*)
- 70 下列何者不是革蘭氏陽性桿菌？  
(A)白喉棒狀桿菌 (*C. diphtheria*) (B)大腸桿菌 (*E. coli*)  
(C)炭疽桿菌 (*Bacillus anthracis*) (D)肉毒桿菌 (*C. botulium*)
- 71 下列何者不是腸內桿菌的抗原？  
(A) O 抗原 (B) H 抗原 (C)莢膜 (D) E 抗原
- 72 對於「D 型肝炎」的敘述，下列何者錯誤？  
(A)可稱為  $\alpha$  型病原體肝炎  
(B)活化複製需要 B 型肝炎病毒 (Hepatitis B virus) 的輔助  
(C)病原體屬於類病毒、擁有套膜及環型 RNA  
(D)會引起猛爆型肝炎
- 73 關於病毒逃避免疫攻擊的機制，下列敘述何者錯誤？  
(A)流行性感冒病毒用抗原轉移 (antigenic shift) 來改變它的外套抗原  
(B)單純疱疹病毒以潛伏的方式，躲藏在神經細胞，以避免免疫系統的辨認  
(C)人類免疫不全病毒 (Human immunodeficiency virus) 是一種超級抗原 (super antigen)，可有效活化 T 細胞免疫反應  
(D)有些病毒可抑制 MHC (major histocompatibility complex) 第一類分子表達
- 74 白色念珠菌 (*C. albicans*) 為正常菌群，但若在下列何處發現時，表示已受感染？  
(A)口腔 (B)腸胃道 (C)女性生殖道 (D)尿道
- 75 目前那一型肝炎，可使用疫苗有效預防嬰兒被母親感染肝炎？  
(A) A 型 (B) B 型 (C) C 型 (D) D 型
- 76 臺灣每年夏天常有登革熱的區域流行，對於登革熱病毒 (dengue virus) 的特性，下列敘述何者錯誤？  
(A)屬於小 RNA 病毒 (picornavirus)  
(B)是一具套膜，單股 (single stranded) RNA 病毒  
(C)斑蚊為主要傳染媒介  
(D)患者會有發燒、發冷、頭痛、背痛等類似感冒之症狀
- 77 實驗室診斷病毒感染的其中一個方法是利用細胞培養方式。下列何種病毒會在患者腦部出現所謂的 Negri 小體 (Negri body)？  
(A)單純疱疹病毒 (Herpes simplex virus) (B)巨細胞病毒 (cytomegalovirus)  
(C)狂犬病病毒 (rabies virus) (D)伊波拉病毒 (Ebola virus)
- 78 治療愛滋病之藥物 zidovudine (AZT) 的作用為：  
(A)阻斷病毒吸附宿主 (B)阻斷病毒脫殼  
(C)阻斷病毒核酸複製 (D)直接抑制病毒蛋白外衣合成
- 79 有關抗病毒藥物的敘述，何者正確？  
(A)多來自其他微生物的代謝產物  
(B)大部分藥物專一性低，且易對宿主細胞產生毒性  
(C)抗病毒藥物的發展遠快於抗菌之藥物  
(D)不易產生抗藥性
- 80 下列有關犬蛔蟲 (*Toxocara canis*) 之敘述，何者正確？  
(A)人吃入它的蟲卵後，蟲卵會在小腸孵化為成蟲而造成病害  
(B)蟲卵進入人體會孵化成幼蟲，可移行到肝臟、肺臟造成病害  
(C)可以檢查糞便中蟲卵，作為診斷依據  
(D)蟲卵進入人體後，很快就會被排出體外

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、  
心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、  
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：2106  
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：護理師

科 目：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 引起外生性院內感染的病菌，下列何者最常見？  
(A)金黃色葡萄球菌 (B)大腸桿菌 (C)鏈球菌 (D)沙門桿菌
- 林小弟，連續三天出現腹瀉情況，糞便檢體發現有痢疾桿菌。下列何者是痢疾的傳染途徑？  
(A)飛沫傳染 (B)媒介物傳染 (C)垂直傳染 (D)空氣傳染
- 承上題，護理師在照顧林小弟時，下列措施何者最適宜？  
(A)安排林小弟在單人房，採取絕對隔離  
(B)林小弟的排泄物需用消毒水浸泡後再沖掉  
(C)所有訪客來探視林小弟時，需先戴上口罩  
(D)林小弟使用過的餐盤需要進行煮沸消毒
- 當病房確定發生火災且濃煙密布時，第一時間所採取的處置，下列何者正確？  
(A)關掉氧氣及電器的開關 (B)進行病人疏散  
(C)打開門窗排除濃煙 (D)拿起滅火器撲滅火源
- 下列那些項目是符合醫療照護相關感染 (health-care associated infection; HAI) 之定義？①胎兒於出生後 36 小時發現感染梅毒 ②住院注射之靜脈導管部位紅腫熱痛 ③注射化學治療藥物滲漏導致局部發炎 ④闌尾炎住院合併腹膜炎 ⑤手術後二天傷口感染發炎 ⑥因泌尿道感染住院期間培養出新菌種  
(A)①③④ (B)②⑤⑥ (C)③④⑥ (D)②④⑤
- 有關健康與疾病概念之敘述，下列何者正確？  
(A)二者是一個動態且絕對的關係 (B)個體在此一連續線上的位置會受內外環境的影響  
(C)是一個明確、客觀且可測量的狀態 (D)二者都有明確且一致性的定義
- 林先生在修理門窗時不慎由二樓摔下來，經家人送到醫院急診時，臉色蒼白、閉眼皺眉、呼吸急促並主訴頭暈。護理師測得其血壓為 142/96 mmHg、心跳 102 次/分。下列何者正確？  
(A)血壓及頭暈為主觀症狀 (B)呼吸急促及臉色蒼白為客觀症狀  
(C)閉眼皺眉及心跳為徵象 (signs) (D)血壓及呼吸急促為徵象
- 一位母嬰同室的產婦對護理師說：「我的寶寶每次吸奶時都會發出聲音，而且不到 2 小時就要餵，太累了，我不想餵了。」下列何者為最合宜的護理措施？  
(A)告知哺餵母乳的優點，請她多忍耐  
(B)觀察家人支持者角色扮演的情形  
(C)告知飢餓及吸吮為人的本能，只要盡到母親的天職就好了  
(D)實際觀察產婦哺餵母乳時的困難，並提供協助
- 有關專業性人際關係的敘述，下列何者錯誤？  
(A)護理師可以經由互動過程中獲得工作上的成就感  
(B)有終止期  
(C)當個案出院後，雙方的關係就轉變為社交性人際關係  
(D)以個案的需要為中心
- 有關護理師「行為過程紀錄與分析」的敘述，下列何者正確？  
(A)主觀描述病人的言行，不記錄護理師當時的情緒  
(B)病人負向的言行表現，才是行為過程紀錄的焦點  
(C)記錄分析時，必須以行為發生的前後情境為依據  
(D)病人重複出現的言行，宜省略不須再詳細記錄過程

- 11 有關護病關係的敘述，下列何者錯誤？  
(A)是為了解決病人所有的問題而建立的關係 (B)又稱為治療性關係  
(C)關係之建立只發生在工作時間 (D)關係之建立只發生在工作場所
- 12 醫囑為 Digoxin 0.25 mg 1# S.L. qd 之含義，下列何者正確？  
(A)持續每天早上給予 Digoxin 0.25 mg 1 顆飯後吞服  
(B)需要時每天早上給予 Digoxin 0.25 mg 1 顆舌下含服  
(C)持續每天早上給予 Digoxin 0.25 mg 1 顆舌下含服  
(D)需要時每天早上給予 Digoxin 0.25 mg 1 瓶皮下注射
- 13 有關護理計畫的擬定，下列何者錯誤？  
(A)病人入院即需立即擬訂護理計畫  
(B)護理計畫會隨著護理對象健康問題的改變而重新修訂  
(C)病人及其親友不需參與護理計畫的擬定  
(D)護理計畫包含非獨立性護理措施
- 14 病人術後第一天 24 小時輸入輸出量紀錄為大量點滴輸入 1200 mL，小便 1500 mL，傷口引流液 550 mL，鼻胃管引流液 550 mL，輸血 200 mL，下列護理處置何者最適宜？  
(A)停止鼻胃管引流，開始由口進食 (B)繼續觀察 1 至 2 天  
(C)需報告醫師處理 (D)先給予限水，並調慢點滴流速
- 15 有關用藥劑量的觀念，下列何者正確？  
(A) 80 歲以上老人用藥劑量是成人之 1/4 (B)使用藥物的劑量一般與體重成正比  
(C) 10 歲以上兒童可服用成人之劑量 (D)運用體表面積計算兒童用藥劑量最不準確
- 16 有關胰島素注射之敘述，下列何者正確？  
(A)應注射在肌肉組織層 (B)使用 1/2 吋針頭時應以 45 度角注射  
(C)注射部位需輪換 (D)注射後，應以手輕揉注射部位，以利吸收
- 17 丁太太昨日接受剖腹手術，術後 24 小時仍未排氣，因此醫囑予 Dulcolax 2# Supp (10 mg) q4h prn。丁太太之醫囑內容為何？  
(A) Dulcolax 丸劑 2 顆，需要時間隔四小時給一次  
(B) Dulcolax 丸劑 2 顆，需要時給一次或每四小時給一次  
(C) Dulcolax 栓劑 2 顆，需要時間隔四小時給一次  
(D) Dulcolax 栓劑 2 顆，需要時給一次或每四小時給一次
- 18 承上題，在給予藥物時，下列何者正確？  
(A)給藥時請丁太太採屈膝仰臥姿勢  
(B)給藥後應以衛生紙壓住肛門，直到丁太太無便意感  
(C)給藥後請丁太太立即下床解便  
(D)不可在藥劑前端塗少量潤滑劑，以免影響藥物吸收
- 19 對長期營養不良、四肢異常消瘦的病人執行肌肉注射時，下列部位何者最適合？  
(A)上臂三角肌 (B)臀部之腹臀肌 (C)臀部之背臀肌 (D)股外側肌
- 20 有關口服藥物之用藥指導，下列何者正確？  
(A) Rifampicin (RIF) 於空腹服用以增強吸收 (B)腸衣錠製劑需磨粉以促進吸收  
(C) Ampicillin 抗生素與果汁併服以沖淡味道 (D)鐵劑與茶葉一起服用可增加藥效
- 21 當病人需要使用 RI (Regular Insulin) 與 NPH 兩種藥物的混合劑時，下列備藥措施何者正確？  
(A)抽藥前用力搖晃 NPH 藥瓶 (B) NPH 使用前須先稀釋  
(C)抽藥時首先抽取 RI 藥瓶 (D)抽藥前先打空氣至 RI 藥瓶再打至 NPH 藥瓶
- 22 護理師為病人的右手熱敷，其左手血管亦產生擴張現象，此現象稱為：  
(A)交感性反應 (consensual response) (B)適應現象 (adaptation)  
(C)反彈現象 (rebound phenomenon) (D)續發性反應 (secondary effect)
- 23 小美沿著靜脈注射處有發紅現象，輸液注入速度變慢，此時下列護理處置何者正確？  
(A)把點滴架調高 (B)更換靜脈注射部位  
(C)用生理食鹽水注入沖洗 (D)在發紅處給予熱敷



- 24 有關血栓靜脈炎的敘述，下列何者錯誤？  
(A)沿著靜脈注射部位有變硬、發紅現象 (B)注射部位給予按摩  
(C)注射部位給予冷敷 (D)注射部位常見紅、腫、熱、痛
- 25 有關乾冷或乾熱在人體應用上的敘述，下列何者正確？  
(A)不會造成皮膚浸潤 (B)可減少乾燥，軟化傷口滲出物  
(C)溫度容易受到蒸發現象的干擾 (D)比濕熱法更容易造成燙傷，在使用時須小心
- 26 鼻黏膜出血的病人，應於何處冰敷以達止血目的？  
(A)鼻子 (B)前額 (C)前頸 (D)臉頰二側
- 27 扭傷 48 小時後，使用熱敷的主要目的，下列何者正確？  
(A)使血液黏稠度增加，促進血液凝固  
(B)促進血液循環，減輕充血腫脹  
(C)降低微血管通透性，使液體進入組織速度減緩，減輕炎症反應  
(D)降低神經傳導速度，減輕疼痛
- 28 有關溫水坐浴治療之敘述，下列何者錯誤？  
(A)若為清潔用途，則水溫溫度應選擇介於  $37.8^{\circ}\text{C}\sim 40.5^{\circ}\text{C}$   
(B)協助病人採舒適坐姿，且肛門及會陰須完全浸於溶液中  
(C)若醫囑無特殊要求，一般坐浴時間為 15~20 分鐘  
(D)坐浴當中若病人感到頭暈，可保持足部低於心臟
- 29 醫囑「Gentamycin 160 mg (4 mL) IVD q12h，加入放置有 96 mL 0.9% normal saline 之精密輸液套管容器內，預計以 1 小時滴完」，下列何者為最適當的滴注速度？  
(A) 70 滴/分 (B) 80 滴/分 (C) 90 滴/分 (D) 100 滴/分
- 30 有關留鹽激素 (Aldosterone) 的敘述，下列何者錯誤？  
(A)由腎上腺皮質所分泌，又稱醛固酮  
(B)主要作用是促進留鈉排鉀  
(C)作用於腎臟的近曲小管，使鈉離子再吸收量增加  
(D)使水分移出腎小管進入血液，以增加血液體積
- 31 有關教導臨床病人預防便秘的護理措施，下列何者錯誤？  
(A)每日睡前使用瀉藥 (B)每日攝取足夠的蔬果  
(C)養成每日定時排便的習慣 (D)每日攝取液體 2000~2500 c.c.
- 32 在大量灌腸過程中，病人主訴感到輕微腹痛時，護理師採用的護理措施，下列何者正確？  
(A)立即拔出肛管，通知醫生 (B)停止灌腸，讓病人躺平休息  
(C)將灌腸筒提高，加快灌腸速度 (D)暫停灌腸，等腹痛消失後再繼續
- 33 上腸胃道出血或服用鐵劑病人之糞便顏色，下列何者正確？  
(A)紅色 (B)黑色 (C)灰白色 (D)黃棕色
- 34 毛先生鼻咽癌接受同步化學治療與放射線治療，口腔內頰有一個  $2 \times 2$  公分的潰瘍，可使用的口腔護理溶液，下列何者不適當？  
(A)以生理食鹽水漱口清潔 (B)以麻醉性溶液漱口止痛  
(C)以 10% 雙氧水漱口清潔 (D)以 2% 硼酸水漱口消除口臭
- 35 為中風老人翻身側臥擺位時，下列敘述何者不適當？  
(A)可促進口鼻的分泌物引流 (B)胸前及兩腿中間放置軟枕  
(C)此擺位造成的受壓部位為枕骨及骶骨 (D)此為餵食時可選擇的擺位
- 36 蔣奶奶 16 小時未解尿，膀胱脹，經誘尿無效需導尿。下列護理措施何者較不適當？  
(A)可採用單次導尿 (B)選擇 14 Fr. 導尿管 (C)導尿管插入 5 公分 (D)一次導出所有尿液
- 37 有關醫療環境中機械性傷害之敘述，下列何者正確？  
(A)婦女是高危險群 (B)常發生在正中午時間  
(C)定向感障礙者宜安置在靠近護理站 (D)臥床病人宜將床面升高避免跌倒
- 38 使用下列何種藥物易導致便秘的問題？①長期使用抗生素 ②含鎂制酸劑 ③鐵劑 ④抗膽鹼激素藥物 (如：Atropine) ⑤麻醉性止痛劑 (如：Morphine)  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③⑤ (D)③④⑤

- 39 下腸胃道出血病人糞便的顏色，下列何者正確？  
(A)灰白色 (B)黑色 (C)紅色 (D)褐色
- 40 決定血壓中舒張壓變動的主要因素，下列何者正確？  
(A)周邊血管阻力 (B)全身循環血量 (C)血液黏稠度 (D)心室收縮力
- 41 身體散熱的主要途徑，下列何者正確？  
(A)皮膚 (B)呼吸 (C)排尿 (D)唾液
- 42 發燒初期 (onset)，病人出現的症狀，下列何者正確？①呼吸速率加快 ②呼吸速率不變 ③呼吸速率變慢 ④皮膚較蒼白 ⑤皮膚顏色不變 ⑥皮膚發紅  
(A)①④ (B)②⑤ (C)③⑥ (D)①⑥
- 43 有關影響體溫的因素，下列何者正確？①甲狀腺素的分泌會使體溫升高 ②正常人一天當中體溫變動在  $0.5\sim 2.5^{\circ}\text{C}$  之間 ③排卵後，體溫上升 ④長期使用 Morphine 會使體溫下降 ⑤吸菸後，體溫會偏高  
(A)①②③ (B)①③⑤ (C)②③④ (D)①④⑤
- 44 有關影響血壓的因素，下列何者錯誤？  
(A)膀胱脹滿會使血壓上升 (B)天氣寒冷會使血壓上升  
(C)顱內壓增高時，血壓上升 (D)飲酒過多，血壓上升
- 45 因心律不整造成缺血性中風，導致左側偏癱且右手點滴滴注的病人測量其血壓時，下列何者正確？  
(A)可測量右下肢肢體血壓 (B)血壓可連續測量三次，以最後一次數值為主  
(C)測量時放氣速度太慢易形成收縮壓偏高 (D)測量時聽診器應放置於尺動脈處
- 46 約束病人時，需注意肢體血液循環，有關評估方式：C.T.M.S.的敘述，下列何者錯誤？  
(A) C 代表顏色 (B) T 代表溫度  
(C) M 代表活動能力 (D) S 代表心理的感受
- 47 高纖維飲食的主要應用原理，下列何者錯誤？  
(A)增加腸道內水分的吸收 (B)減少腸道內的殘渣量  
(C)縮短腸道內殘渣停留時間 (D)促進腸道的蠕動
- 48 長期坐輪椅的病人，最可能出現壓瘡的部位，下列何者錯誤？  
(A)坐骨結節突出處 (B)兩腳膝蓋內側 (C)肩胛骨 (D)大粗隆
- 49 陳女士，68 歲，家管，主訴晚上睡不好做夢多，晚上躺床後不易入睡，白天容易打瞌睡，平常下午午睡約 45 分鐘，傍晚會外出買菜順便散步 30 分鐘，煮晚餐吃過飯後洗澡看電視，約 10 pm 上床睡覺習慣開著燈，6 am 起床。過去病史包含糖尿病與心臟病，目前服用降血壓藥、降血糖藥、利尿劑、強心劑等藥物規律控制中，根據以上敘述，下列那些因素最可能會影響陳女士的睡眠？①缺乏運動 ②午睡太久 ③多重用藥 ④強心劑如 Digoxin 易導致惡夢 ⑤生活不規律 ⑥夜間睡眠燈光太亮  
(A)①②⑤ (B)①③⑥ (C)②④⑤ (D)③④⑥
- 50 承上題，改善陳女士的睡眠照護計畫，下列何者正確？①建議睡前 2~4 小時少喝水 ②晚上多運動 ③請醫師調整多重用藥 ④白天多次小睡以彌補不足的睡眠 ⑤調整夜間睡眠光線為昏暗 ⑥建議長期使用安眠藥  
(A)①③⑤ (B)②③⑥ (C)③④⑤ (D)④⑤⑥
- 51 有關營養素的敘述，下列何者正確？  
(A)非必需胺基酸是人體無法自行合成，必須由食物中攝取  
(B)醣類缺乏時會使身體過度消耗肌肉與脂肪組織  
(C)膳食纖維主要來自植物細胞壁等，人體可消化吸收利用  
(D)蛋白質可抑制胃酸分泌，並幫助維生素的吸收
- 52 陳小姐目前為月經來潮第三天，收集陳小姐尿液以進行常規檢查的方法，下列何者較適宜？  
(A)以留置導尿管收集尿液檢體 (B)以單次導尿方式收集尿液檢體  
(C)直接收集中段尿 (D)先予以會陰沖洗後，再收集中段尿
- 53 楊爺爺，72 歲，診斷為肺癌合併右肋、胸椎、骨盆等多處轉移，因疾病惡化處於瀕死階段，喉嚨發出臨終嘎音 (death rattle)，下列護理措施何者最適宜？  
(A)協助抽痰維持呼吸道通暢  
(B)給予背部叩擊促進痰液鬆動  
(C)依醫囑給予 hyoscine hydrobromide (Scopolamine)  
(D)協助 100% 氧氣使用

- 54 王小弟，4 歲，罹患罕見疾病，因多重併發症入院治療，其住院醫師目前正從事此疾病相關研究，要求護理師為病人抽血時，順便多留 5 c.c. 血液檢體提供研究之用，護理師的回應下列何者最適宜？  
(A) 遵從醫囑多抽 5 c.c. 血液檢體，展現醫護合作  
(B) 因未增加病人額外的侵入性治療，無關倫理問題  
(C) 發現新知有助於醫療突破，考量病人利益協助抽血  
(D) 告知醫師必須徵求孩童父母知情同意
- 55 一位 50 歲男性，離婚，曾擔任機師已被確診為肺癌末期病人，經歷過化學治療、放射線治療及標靶治療。近日因出現嚴重的喘、呼吸困難及意識改變而入院治療，但因疾病持續進展，目前病人已面臨「瀕死」的階段。此階段病人可能會出現之生理變化，下列何者正確？①希式面容（Facies Hippocratica） ②畢歐氏呼吸（Biot's respiration） ③鞏膜水腫 ④幻視覺或幻聽覺 ⑤疼痛減弱或消失  
(A) ①②⑤ (B) ①③④ (C) ②④⑤ (D) ③④⑤
- 56 承上題，此階段護理師給予病人的生理照護措施，下列何者錯誤？  
(A) 鼓勵病人攝食或給予非腸道營養以維持體力 (B) 雙眼可以生理食鹽水紗布覆蓋  
(C) 意識混亂或病人躁動，必要時可給予鎮靜劑 (D) 可給予嗎啡類藥物改善呼吸困難
- 57 現代管理理論中，下列何者運用科學的研究與實驗方法，設計出專業分工原則？  
(A) 泰勒 (B) 費堯 (C) 韋伯 (D) 赫茲伯格
- 58 某護理師發藥的過程中常因在電腦系統上尋找藥物的作用，也常因病人家屬要乾淨的床單而中斷發藥，亦也常因須回護理站回電而中斷病人衛教。情境中那一部分是屬於干擾時間管理的內在因素？  
(A) 常在電腦系統上尋找藥物的作用 (B) 病人家屬要乾淨的床單  
(C) 回到護理站回電 (D) 中斷病人衛教
- 59 醫院管理理念中，下列何者不屬於 Y 理論的觀點？  
(A) 民主方式 (B) 鼓勵員工參與 (C) 計畫方案有彈性 (D) 傾向外在控制的評值
- 60 有關「80/20」的原理，下列何者錯誤？  
(A) 運用關鍵的多數，就能掌握重要的少數 (B) 義大利經濟學者提出  
(C) 20% 的投入付出，可得 80% 的產出收穫 (D) 巴瑞多（柏拉圖）原理（Pareto principle）
- 61 醫院中將護理組織分為主任—副主任—督導—護理長—副護理長—護理師／護士，此工作評價的方法，下列何者正確？  
(A) 因子比較法（factor comparison） (B) 工作分級法（job ranking）  
(C) 工作分類法（job classification） (D) 點數系統法（point system）
- 62 組織工作說明書的內容，下列何者最不應包含在內？  
(A) 具備愛心、耐心及經濟能力 (B) 具大專（含）以上護理學歷  
(C) 具有護理師或護士證照 (D) 須要輪值晚夜班
- 63 發展病人分類系統的優點，下列何者不包含在內？  
(A) 可預測病人個別性的護理需要 (B) 可縮短病人住院天數  
(C) 可建立分配照護病人的標準 (D) 可預測所需的護理人力
- 64 某病房跌倒發生率高，經檢討分析後，歸納跌倒原因為病人夜間如廁、無人扶持，造成此問題的原因可歸類於下列何者？  
(A) 人力問題 (B) 技術問題 (C) 營運問題 (D) 設備問題
- 65 下列何者不屬於「組織文化」中的含義？  
(A) 組織氣氛 (B) 組織創造力 (C) 組織經費 (D) 組織價值觀
- 66 有關使命（mission）的敘述，下列何者正確？  
(A) 必須是專一特定的性質 (B) 可以隨情況作機動性改變  
(C) 不見得與市場有所關聯 (D) 代表組織存在的意義
- 67 有關人力資源的敘述，下列何者錯誤？  
(A) 以現有人力資源決定組織的任務規模 (B) 人力資源係指所有可支配人力的總和  
(C) 人力資源包含人員的核心能力 (D) 人力資源是機構中重要的資產

- 68 機構中員工流動率（turnover rate）的理想範圍，下列何者適當？  
(A) 1%以下 (B) 1.1%~4.9% (C) 5%~10% (D) 10.1%~15%
- 69 某 100 床之醫院，其護理師專業成熟度及自主性高，下列何種組織結構較適宜？  
(A)官僚式組織 (B)矩陣式組織 (C)扁平式組織 (D)集權式組織
- 70 下列何者不是促進主管授權的因素？  
(A)能減輕主管自己的時間限制 (B)能卸除主管本身的責任  
(C)能拓展主管的威勢 (D)能培育員工
- 71 有關休假係數的敘述，下列何者錯誤？  
(A)護理人員年資會影響病房的休假係數 (B)國定假日放假天數會影響病房的休假係數  
(C)病房床數不會影響病房的休假係數 (D)護理人力不受病房的休假係數的影響
- 72 有關授權原則的敘述，下列何者錯誤？  
(A)只限於例行性工作 (B)逐級授權 (C)不可重複授權 (D)公開授權
- 73 單位主管要求每位員工每月須從事 4 小時之義工服務，員工雖不滿但仍配合，此乃主管具有下列何種權力？  
(A)參考權 (B)獎賞權 (C)強制權 (D)專家權
- 74 有關 Blake 等人提出的管理方格理論，下列何者錯誤？  
(A) X 軸是領導者對員工的關心程度  
(B)以 X 與 Y 軸分別標出五種不同的領導行為  
(C)屬於一種行為理論的觀點  
(D)依照方格位置可提供領導者發展出合適的領導行為
- 75 某醫院急診室凌晨接到因瓦斯管氣爆的傷患，院長立即至急診室現場坐鎮指揮，命令各急救區域的負責人安置及治療傷患，並指派資深人員安頓及照護原有的急診室病人。院長運用 Douglass 提出的領導統御型態是下列那一種？  
(A)集權式 (B)民主式 (C)放任式 (D)參與式
- 76 為解決病人抱怨抽血等候時間過長，品管中心專員開始收集資料，到門診實地勘查、查閱紀錄或晤談方式進行資料整理，依據問題解決過程之分析資料，下列何者不是這個階段應執行的工作？  
(A)依資料篩選出最省錢且容易執行的解決方案  
(B)依資料類別（如：人、事、時、地、物）加以整理  
(C)依資料時間順序排列找出等候過程與時間的關聯  
(D)利用魚骨圖整理資料間的因果關係
- 77 品管圈小組透過查核、問卷調查找出造成病人血液管路感染率的根本原因後，成員欲使用新七手法找出改善的策略，下列何者不適用？  
(A)關聯圖 (B)柏拉圖 (C)系統圖 (D)矩陣圖
- 78 某護理師，白班早上備藥時按照規範進行三讀五對，赫然發現藥局配的藥物出現每日劑量與醫囑不一致，應該是每日一顆 0.5 mg/顆，藥局配成每日一顆 1.0 mg/顆。此時護理師最應先執行的行為，下列何者正確？  
(A)先重新核對醫囑確認劑量及每日應有的顆數  
(B)先打電話到藥局澄清該藥物是否是新包裝  
(C)直接將藥物自行撥一半給病人以免耽誤吃藥時間  
(D)直接打電話問醫師確認應該給的劑量
- 79 承上題，經核對醫囑後，護理師將藥物退回藥局請他們重新配置藥物。所幸該錯誤之藥物尚未發給病人使用。上述的情況是屬於下列何種異常事件？  
(A)意外事件（accident） (B)哨兵事件（sentinel event）  
(C)跡近錯失（near miss） (D)無傷害事件（no harm event）
- 80 護理長與該單位的護理同仁共同設定明年度 N3 及 N4 的人數要增加 20%，並策劃相關的教育訓練及輔導以協助同仁達到目標，此為下列何種評核方式？  
(A)自我考核法 (B)心理評估法 (C)評核中心法 (D)目標管理法

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、  
心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、  
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：3106  
頁次：6-1

等 別：高等考試  
類 科：護理師  
科 目：內外科護理學  
考試時間：1 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。  
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。  
(三)禁止使用電子計算器。

- 林先生因頭部外傷需要裝置顱內壓監測系統的敘述，下列何者錯誤？  
(A)病人體外零點的正確位置等同腦室內的室間孔 (foramen of Monro)  
(B)應觀察插管處有無滲漏或發炎現象  
(C)調整病人床頭不會造成體外監測系統零點位置的改變  
(D)可以適度引流腦脊髓液以降低顱內高壓
- 林先生手術移除額葉腦腫瘤後返回神經外科加護單位觀察，病人突然全身性抽搐，下列措施何者不適當？  
(A)立即提供 100% O<sub>2</sub> (B)記錄病人抽搐的部位及持續時間  
(C)確認床欄是否拉起 (D)喚醒病人以防昏睡
- 有關脊髓損傷導致自主神經反射過度之敘述，下列何者正確？  
(A)常發生於脊髓休克期 (B)因副交感神經被過度刺激  
(C)常見引發的原因是膀胱脹 (D)出現嚴重的高血壓及心跳加速
- 有關出血性腦中風病人的護理措施，下列何者正確？  
(A)於中風發生 3 小時內給與血栓溶解劑 (B)給與 MgO 以避免便秘引起顱內壓升高  
(C)給與 Aspirin 以避免頭痛及發燒 (D)維持平躺姿勢以增加腦部血流
- 有關巴金森氏症病人服用 levodopa 藥物之護理指導，下列何者正確？①補充維生素 B<sub>6</sub> 以促進藥物吸收  
②補充高蛋白飲食以增加藥物效果 ③可能會出現舞蹈症或不自主運動 ④長期使用會出現 on-off 反應  
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 評估大腦各葉與腦幹功能常用之診斷檢查，下列何者正確？  
(A)腦部掃描 (B)核磁共振影像 (C)腦血流檢查 (D)誘發電位檢查
- 有關叢性頭痛 (cluster headaches) 之敘述，下列何者錯誤？  
(A)好發於成年男性之單側頭痛 (B)疼痛側的眼睛會流淚，患側皮膚會發紅  
(C)通常沒有先兆，多在夜晚某個相同時段發作 (D)發作時，應建議病人熱敷，且讓其安靜獨處
- 下列何者為重症肌無力病人最早出現的症狀？  
(A)眼瞼下垂 (B)吞嚥困難 (C)呼吸困難 (D)四肢無力
- 有關肝硬化病人會出現手掌紅斑之原因，下列何者正確？  
(A)門靜脈高壓 (B)細菌感染 (C)血清膽紅素堆積 (D)肝臟荷爾蒙代謝減少
- 有關肛門瘻管手術治療後之合併症，下列何者最少見？  
(A)出血 (B)便秘 (C)解便失禁 (D)瘻管復發
- 下列何者顯示結腸造口病人可能有貧血現象？  
(A)造口呈藍紫色 (B)造口嚴重水腫 (C)造口呈蒼白色 (D)造口呈粉紅色
- 有關食道癌的敘述，下列何者錯誤？  
(A)腺癌最常見 (B)好發在食道中後段 (C)吞嚥困難為常見症狀 (D)性別以男性居多

- 13 分泌胃酸之部位，下列何者正確？  
(A)胃小彎 (B)壁細胞 (C)胃大彎 (D)主細胞
- 14 有關罹患膽結石的高風險族群，下列何者錯誤？  
(A)使用口服避孕藥者 (B)服用動情素治療的停經婦女  
(C)喜歡吃蔬菜水果者 (D)肥胖女性
- 15 有關腹水病人居家照護之敘述，下列何者錯誤？  
(A)每日監測體重及腹圍 (B)勿舉重物及過勞  
(C)飲食不需有任何限制 (D)不可隨意服用藥品
- 16 有關腸阻塞的敘述，下列何者正確？  
(A)迴腸以下阻塞會出現噁心和嘔吐  
(B)全身性循環血量嚴重減少，而引起低血壓  
(C)腸壓增加，腸道吸收及液體滯留能力降低，而使尿量增加  
(D)血管內鈉離子、鉀離子及白血球數均下降
- 17 有關骨折癒合及治療之敘述，下列何者錯誤？  
(A)成人骨折癒合時間約需 10~18 週  
(B)骨折後 6 個月仍可見骨折線且骨痂生長緩慢稱為骨折不癒合  
(C)骨折術後使用 Aircast 加壓冷療可減輕腫脹與疼痛  
(D)可藉由復位將骨折部位恢復正常解剖位置
- 18 有關軟組織損傷之敘述，下列何者錯誤？  
(A)因鈍力造成挫傷，立即給與熱敷，促進液體吸收  
(B)需使用 X 光檢查排除骨折，再用“PRICE”進行臨床處置  
(C)可使用止痛劑緩解疼痛，採漸進式增加活動  
(D)部分韌帶撕裂，需使用彈繃固定，預防進一步傷害
- 19 有關痛風性關節炎急性期病人之護理指導，下列何者正確？  
(A)服用 Allopurinol 可以抑制炎症反應 (B)使用護架可以減輕疼痛  
(C)熱敷可以減輕炎症反應 (D)執行全關節運動可以減輕患部腫脹
- 20 有關全髖關節置換術病人出院之護理指導，下列何者正確？  
(A)採取等張肌肉運動以維持肌肉力量 (B)坐著時應保持雙膝分開，避免兩腿交叉  
(C)撿拾地上物品時，應以蹲下代替彎腰動作 (D)性生活、駕車等活動可在術後 4 週恢復
- 21 有關白內障症狀之敘述，下列何者錯誤？  
(A)視力減退 (B)眼睛疼痛 (C)畏光 (D)單眼複視
- 22 有關美尼爾氏症之敘述，下列何者正確？  
(A)出現傳導性聽力喪失 (B)雙側聽力喪失  
(C)為低頻率聲音聽力喪失 (D)耳鳴為高音調嗡嗡聲
- 23 有關鼻咽癌症狀之敘述，下列何者錯誤？  
(A)大量鼻血 (B)中耳積水 (C)聽力減退 (D)頸部淋巴結腫大
- 24 有關喉癌之敘述，下列何者錯誤？  
(A)喉癌大多屬鱗狀細胞癌 (B)長期抽菸為喉癌致病因素  
(C)聲音嘶啞為喉癌早期症狀 (D)聲門上喉癌較少發生淋巴轉移

- 25 李先生 75 歲由家人送至急診室，主訴有胸悶、噁心、呼吸困難情形，外觀臉色蒼白、情緒顯焦慮，下列護理措施何者不適宜？
- (A) 放置靜脈留置針 (B) 行 12 導程心電圖檢查  
(C) 給與氧氣 (D) 給與 Lorazepam (Ativan) 靜脈注射
- 26 懷疑病人罹患心內膜炎時，護理師最需要收集的資料，下列何者正確？
- (A) 是否有心臟病家族史 (B) 有無抽菸  
(C) 有無心臟血管手術紀錄 (D) 有無體重增加情形
- 27 毛地黃中毒最常出現的症狀，下列何者正確？
- (A) 噁心嘔吐 (B) 視力模糊  
(C) 房室傳導阻礙 (A-V block) (D) 心搏過慢
- 28 有關高血壓病人之日常生活護理指導，下列何者正確？
- (A) 為增加血中高密度脂蛋白，應養成規律運動的好習慣  
(B) 為減少酒精之攝取，應酬時建議以茶代酒  
(C) 為紓解壓力、放鬆肌肉，建議泡溫泉或泡熱水澡  
(D) 為避免引起伐氏 (Valsalva) 效應，建議運動以等長運動較佳
- 29 有關心律不整之治療，下列何者正確？
- (A) 2° A-V block 可採去纖維震顫術改善 (B) 3° A-V block 可使用頸動脈竇按摩方式改善  
(C) APC 不需要特別治療 (D) Af 可口服 Heparin 以避免血栓形成
- 30 有關病人接受初期心臟復健運動之原則，以其活動時心跳增加速率不超過休息時多少百分比？
- (A) 10% (B) 15% (C) 20% (D) 25%
- 31 心肌梗塞後病人所出現的心電圖變化，下列何者一旦出現最有可能永遠不會消失？
- (A) T 波倒置 (B) ST 段升高 (C) 不正常 Q 波 (D) QRS 綜合波變窄
- 32 下列何種檢查沒有輻射危害？
- (A) 骨掃描 (B) 電腦斷層 (C) 正子掃描 (D) 核磁共振攝影
- 33 有關化學治療靜脈給藥之敘述，下列何者正確？
- (A) Port-A 最常植入的位置是上腔靜脈  
(B) 植入 Port-A 時，通常採用全身麻醉  
(C) 選擇注射部位時，建議先從近心端，再選擇遠心端  
(D) 靜脈注射之血管，選擇直徑大、有彈性的為原則
- 34 有關乳癌病人荷爾蒙治療之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 治療副作用有倦怠、皮膚癢、噁心嘔吐等  
(B) 停經後婦女比停經前婦女的治療效果好  
(C) Tamoxifen 是轉移性乳癌第一線用藥，一般療程為 5 年  
(D) 體內動情素受體和黃體素受體含量越低，治療反應越好
- 35 章小姐在癌症治療過程中，向護理師反應「我快要死了，再也看不到我女兒了」，以庫伯勒-羅斯癌症病人的心理反應，是屬於下列那個階段？
- (A) 震驚與否認期 (B) 磋商期 (C) 憂鬱期 (D) 接受期
- 36 有關癌症病人臨床實驗室檢查結果之敘述，下列何者正確？
- (A) 白血球數目一定是低於正常值 (B) 骨骼轉移，常出現高血鈣情形  
(C) 化學治療破壞細胞，會使尿酸降低 (D) 腫瘤指標可作為診斷的依據

- 37 有關缺鐵性貧血口服鐵劑護理措施的敘述，下列何者錯誤？  
(A)鼓勵與牛奶共食 (B)鼓勵與果汁一起服用  
(C)避免同時服用制酸劑 (D)應於二餐之間服用
- 38 下列何種疾病有 90%的病人體內可發現費城染色體（Philadelphia chromosome）？  
(A)急性骨髓性白血病 (B)慢性骨髓性白血病 (C)急性淋巴性白血病 (D)慢性淋巴性白血病
- 39 下列那種檢查是協助確定癌症診斷最有效的方法？  
(A)超音波 (B)內視鏡 (C)電腦斷層 (D)核磁共振攝影
- 40 有關造成大量凝血活酶釋入血液中，導致凝血因子全面活化，促使全身血管內凝血之情況，下列何者錯誤？  
(A)敗血症 (B)羊水栓塞 (C)毒蛇咬傷 (D)慢性淋巴性白血病
- 41 有關腫瘤溶解症候群的處置，下列何者錯誤？  
(A)預防性給與類固醇及抗組織胺劑 (B)水分補充  
(C)預防性給與降尿酸藥物 (D)密切監控病人尿量及小便酸鹼值
- 42 有關一氧化碳中毒的臨床表徵，下列何者正確？  
(A)吐氣喘鳴聲及鼻翼煽動 (B)黏膜出現櫻桃紅  
(C)痰液含有煤炭 (D)咳嗽
- 43 有關嚴重燒傷病人急性期的疼痛處置，下列何者最適當？  
(A) morphine 4 mg IV every 5 minutes (B) morphine 10 mg IM q4H  
(C) meperidine 50 mg PO q4H (D) fentanyl citrate (Duragesic) 75 mcg patch q3D
- 44 有關疥瘡病人照護方式之敘述，下列何者錯誤？  
(A)感染病人的所有家人必須一併接受治療  
(B)照護時應採接觸隔離，戴手套及穿戴隔離衣  
(C)病人衣物應用熱水煮沸 10 分鐘，不可使用烘乾機烘烤  
(D)病人使用過的家具、物品洗清後密封靜置 2 星期
- 45 有關燒傷傷口臨床表徵的敘述，下列何者正確？  
(A)表淺部分皮層燒傷部位會有水泡形成，中重度疼痛  
(B)四度燒傷傷口呈現乾燥、焦黑、中重度疼痛  
(C)深二度燒傷傷口皮膚呈現粉紅色、紅腫、劇烈疼痛  
(D)三度燒傷傷口皮膚乾燥、受壓不會變蒼白、皮革狀焦痂
- 46 有關 HIV 疾病進展的敘述，下列何者錯誤？  
(A) HIV 的抗體可阻止 HIV 感染的發展  
(B) HIV 感染者 CD4 小於 200/ $\mu$ L 時，易發生伺機性感染  
(C)首次感染 HIV 後 2~4 星期，50% 以上的病人會出現短暫類似感冒的症狀  
(D)卡波西氏肉瘤是愛滋病最常見的惡性腫瘤
- 47 有關發生急性溶血性輸血反應處置之敘述，下列何者錯誤？  
(A)密切監測生命徵象 (B)輸血不能中斷  
(C)收集血液及尿液標本送檢 (D)記錄輸出入量
- 48 有關過敏性疾病的實驗室檢查，下列何者錯誤？  
(A)血清 IgE 的濃度上升 (B) C3、C4 補體下降  
(C)嗜伊紅球（嗜酸性球）上升 (D)白血球下降



- 49 有關全身性紅斑性狼瘡的診斷檢查結果，下列何者錯誤？  
(A)抗 DNA 抗體升高 (B)抗核抗體 (ANA) 效價大於 80  
(C)紅血球沉降率 (ESR) 降低 (D) C3 和 C4 補體下降
- 50 下列何者為確診病人有無肺結核感染最準確的方式？  
(A)支氣管鏡 (B)痰液培養 (C)胸部 X 光 (D)結核菌素皮膚試驗
- 51 肺炎病人合併低血氧時最早出現的精神狀態改變，下列何者正確？  
(A)昏迷 (B)躁動不安 (C)憂鬱 (D)欣快感
- 52 評估使用呼吸器病人其氣管內管位置正確性的方式，下列何者最適當？  
(A)評估病人的膚色 (B)監測病人的呼吸速率  
(C)確認 cuff 內氣體的量 (D)聽診雙側呼吸音
- 53 評估疑似肺栓塞病人時，最可能發現下列何種症狀？  
(A)突然發冷、發燒 (B)突然胸痛 (C)出現噁嘴式呼吸 (D)出現泡沫痰
- 54 有關慢性支氣管炎的病理變化，下列何者錯誤？  
(A)杯狀細胞數目增加 (B)纖毛上皮細胞數目減少  
(C)肺的回縮力量降低 (D)缺氧導致右心衰竭
- 55 有關慢性阻塞性肺部疾病病人的飲食指導，下列何者錯誤？  
(A)少量多餐 (B)攝取適量的鈣、鉀離子  
(C)增加碳水化合物飲食 (D)製作成易咀嚼的食物
- 56 接受胸腔放液穿刺術後的病人，需監測的合併症，不包括下列何者？  
(A)凝血功能變差 (B)氣胸 (C)肺水腫 (D)低血壓
- 57 肺炎病人接受抗生素治療，下列何者表示抗生素已發揮作用？  
(A)周邊血氧濃度降低 (B)胸部 X 光檢查實質化部位增加  
(C)血中全血球計數數量增加 (D)體溫降低及濃痰減少
- 58 下列何者為檢測腎絲球過濾率的最佳指標？  
(A)尿液培養 (B)腎臟、輸尿管、膀胱攝影  
(C)肌酸酐廓清率 (D)酚紅試驗
- 59 下列何種藥物可以直接灌注於膀胱內以治療膀胱癌？  
(A) BCG (B) cisplatin (C) methotrexate (D) vinblastine
- 60 與尿液 pH 值無關之尿路結石成分，下列何者正確？  
(A)尿酸 (B)磷酸鈣 (C)草酸鈣 (D)胱胺酸
- 61 有關睪丸癌最主要的危險因子，下列何者正確？  
(A)隱睪症 (B)精索曲張 (C)長期接觸金屬物 (D)無精蟲症
- 62 正常成年人，若膀胱容積壓力正常，最大尿流速低於下列何者即顯示尿道出口有阻塞現象？  
(A) 40 mL/秒 (B) 30 mL/秒 (C) 20 mL/秒 (D) 10 mL/秒
- 63 有關腎前性急性腎衰竭之檢驗數據，下列何者錯誤？  
(A)血液尿素氮與肌酸酐的比 >20 : 1 (B)尿鈉離子濃度 >40 mEq/L  
(C)尿比重 >1.015 (D)尿滲透壓增加至 500 mOsm/L
- 64 有關雙胍類降血糖藥物 Metformin (Glucophage) 之敘述，下列何者正確？  
(A)飯前服用效果最佳 (B)肝臟疾病病人可安心服用  
(C)增加胰島素分泌為其主要的藥理作用 (D)易出現噁心或食慾減退等胃腸道刺激副作用
- 65 有關甲狀腺機能亢進病人服用碘製劑之注意事項，下列何者正確？  
(A)水溶性碘應貯存於紙杯 (B)應以吸管飲用，避免牙齒染色  
(C)服用放射性碘後，應限制飲水 (D)不可與牛奶或果汁混合飲用

- 66 有關黏液性水腫昏迷之敘述，下列何者正確？  
(A)出現高血糖徵象 (B)血清中甲狀腺素降低  
(C)需以抗甲狀腺藥物治療 (D)為副甲狀腺機能亢進的重要合併症
- 67 有關第 2 型糖尿病之敘述，下列何者正確？  
(A)多發生於成年期 (B)發病與自體免疫有關  
(C)需終生依賴胰島素治療 (D)因胰島素接受器增加所造成
- 68 有關腦下垂體前葉分泌之激素，不包括下列何者？  
(A)生長素 (B)促乳素 (C)催產素 (D)黃體促素
- 69 下列何者不是肢端肥大症之症狀？  
(A)葡萄糖耐受性降低 (B)少汗症 (C)多毛症 (D)關節痛
- 70 低血容積與脫水的病人會出現的臨床表徵，不包括下列何者？  
(A)心跳過速 (B)脈搏消失或呈絲脈 (C)黏膜潮濕 (D)心智狀況改變
- 71 有關尿崩症病人的出院護理指導，下列何者不適當？  
(A)教導自我注射藥物的方法 (B)告知隨身攜帶識別卡  
(C)教導維持與測量體液狀態的方式 (D)教導使用鼻噴霧劑，並須確認藥劑確實吸入肺部
- 72 為路倒者執行心肺腦復甦術期間，當接上電擊器顯示為心搏停止，此時應執行之急救措施，下列何者正確？  
(A)立即開始給予 360 焦耳之電擊以去顫 (B)立即開始給予 200 焦耳之電擊以去顫  
(C)先貼上膠狀之電擊貼片 (D)繼續執行心肺腦復甦術
- 73 有關診斷敗血症之檢驗項目，下列何者錯誤？  
(A)細菌培養 (B)白血球計數 (C) C-反應蛋白 (D)血糖
- 74 有關促進中毒物質排出之方法，不包括下列何者？  
(A)使用瀉藥 (B)酸化尿液 (C)使用人工呼吸器 (D)鹼化尿液
- 75 有關腸病毒之敘述，下列何者錯誤？  
(A)致病原為 DNA 病毒的一種 (B)常於夏季初秋流行  
(C)經病人口鼻分泌物、糞便、飛沫等傳染 (D)目前除了小兒麻痺病毒外，尚無疫苗可預防
- 76 有關登革熱之敘述，下列何者錯誤？  
(A)埃及斑蚊及白線斑蚊為主要的傳染媒介 (B)潛伏期約 3~8 天（最長可達二個星期）  
(C)需採用接觸隔離措施 (D)避免使用 aspirin 及 indomethacin 退燒止痛
- 77 針對心臟衰竭病人的評估結果，下列何者最需要護理師密切觀察？  
(A)下肢水腫 (B)呼吸音出現囉音 (rales)  
(C)血壓 146/88 mmHg (D)微血管再填充試驗 (capillary refill test) 小於 3 秒
- 78 有關末期腎疾病 (ESRD) 病人，因腎性貧血接受紅血球生成素 (EPO) 治療之準則，下列何者錯誤？  
(A)血球比容至少要達到 35% (B)血清鐵蛋白應大於 200 ng/mL  
(C)運鐵蛋白飽和度應大於 20% (D)無惡性高血壓
- 79 楊先生 50 歲，患有高血壓超過 10 年，目前被診斷有慢性腎疾病，為減緩腎功能衰退，應指導其血壓控制在下列何種範圍？  
(A) 130/85 mmHg 以下 (B) 140~145/85~90 mmHg  
(C) 145~150/90~95 mmHg (D)視病人情況而定
- 80 有關體溫過低病人採取回溫措施期間的支持性處置，下列何者錯誤？  
(A)給予溫的靜脈輸液，以維持尿量 (B)用人工呼吸器給予正壓及溫暖潮濕的氧氣  
(C)以重碳酸鈉改善代謝性酸中毒 (D)體溫低於 30°C 之自發性心室顫動，予以電擊

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、  
心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、  
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等 別：高等考試

類 科：護理師

科 目：產兒科護理學

考試時間：1 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 生產是家庭關係重新開始的重要一環，下列何項醫療院所的政策有助於此理念的推展？  
(A)禁止家庭成員參與生產  
(B)若沒有合併症，提倡早期出院  
(C)為避免感染，嬰兒必須待在嬰兒室  
(D)在完成新生兒點眼藥後再進行第一次母乳哺餵
- 2 產科護理師針對護理照顧內容進行討論，並發展及驗證合適的護理措施，藉以提升專業之照護品質，是屬於下列何種角色功能？  
(A)支持者 (B)教育者 (C)諮詢者 (D)研究者
- 3 姜女士懷孕 12 週，最後一次月經 (LMP) 為民國 104 年 2 月 25 日，懷孕前月經週期均約 30 天左右，其預產期約在何時？  
(A) 104 年 11 月 1 日 (B) 104 年 12 月 2 日 (C) 104 年 10 月 4 日 (D) 105 年 1 月 2 日
- 4 有關精液分析檢查的說明，下列何者錯誤？①禁慾 3~7 天再採檢 ②使用保險套和性交中斷法來收集精液 ③留取精液後 2~3 小時內送至檢查地點 ④精液必須冷凍保存  
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④
- 5 孕期婦女需增加碘的攝取，主要促進胎兒何部分的發育？  
(A)腦部神經發育 (B)肺泡細胞發育 (C)腎上腺發育 (D)腸道細菌叢發育
- 6 有關胚胎與胎兒的發育，下列敘述何者正確？  
(A)細胞分裂最繁忙、快速的時期為胚胎期  
(B)胚胎發育最容易受外在刺激，而導致畸型的時期為 12~16 週  
(C)胎兒愈成熟，皮下脂肪和胎毛愈多  
(D)胎兒發育在第 6 個月開始有吞嚥能力，同時也開始產生胎便
- 7 胎兒生理活動評估 (Biophysical profile) 測試內容中以超音波評估的項目包括那些？  
(A)胎兒呼吸、胎動、胎兒身體張力、羊水容積  
(B)胎兒呼吸、臍帶血流量、胎兒體重、羊水容積  
(C)胎兒心跳、胎動、臍帶血流量、胎兒體重  
(D)胎兒心跳、胎動、臍帶血流量、胎兒身體張力
- 8 有關無壓力試驗 (Non-stress test) 的敘述，下列何者正確？  
(A)胎心音維持在 140 下/分、變異性 < 5bpm，表示胎心音穩定，為反應型  
(B)若出現 20 分鐘沒有胎動，則應馬上報告，緊急處理  
(C)若 20 分鐘有 2 次以上胎動，胎動時心跳上升 15bpm 持續 15 秒，為反應型  
(D)試驗期間約 20~30 分鐘，孕婦必須平躺以確保紀錄正確

- 9 有關海洋性貧血的敘述，下列何者錯誤？
- (A)是一種體染色體顯性遺傳疾病  
(B)  $\alpha$  型海洋性貧血是第 16 對染色體控制  $\alpha$  型血球素製造的基因缺損  
(C)  $\beta$  型海洋性貧血是第 11 對染色體控制  $\beta$  型血球素製造的基因缺損  
(D)要根治  $\beta$  型海洋性貧血的唯一方法是骨髓移植
- 10 5 歲小美詢問媽媽：「為什麼妹妹會住在媽媽的肚子裡面，妹妹可以出來和我見面嗎？」護理師給予母親的建議，下列何者最適當？
- (A)小美目前對懷孕尚無法理解，可等她上小學後再給予說明  
(B)小美可能很焦慮，需要媽媽多陪伴她  
(C)小美可能想知道生產過程，可帶她參觀產房  
(D)小美可能對懷孕過程好奇，可用圖畫書說明懷孕過程
- 11 有關護理師進行新生兒抽吸之敘述，下列何者正確？
- (A)新生兒維持仰臥，頭部抬頭 15 度  
(B)抽吸管放入口腔時，持續保持壓力抽吸  
(C)抽吸壓力為 150~200 mmHg  
(D)過度抽吸會造成新生兒心跳速率減低
- 12 有關生產時會陰消毒原則，下列何者錯誤？
- (A)由陰阜開始往上至下腹部  
(B)由腹股溝內側至大腿前半段  
(C)由肛門口開始至尿道口  
(D)通常採用水溶性優碘
- 13 下列何者為運用門閥理論來緩解宮縮疼痛不適的措施？
- (A)聽音樂  
(B)溫水淋浴  
(C)尾骶骨按摩  
(D)注意力集中法
- 14 高女士第一胎，待產時子宮收縮每 5~7 分鐘一次，持續時間 30~40 秒，強度為輕微~中度，子宮頸口為 2~3 公分，少許陰道出血，尚未破水，神情顯得愉快。此時適宜的護理指導為何？
- (A)教導經常記得排空膀胱  
(B)教導禁食以防嘔吐  
(C)建議絕對臥床休息，禁止下床走動  
(D)建議施行人工破水以助於胎頭下降
- 15 高女士已超過預產期 3 天，醫師建議入院引產，下列敘述何者正確？
- (A)比夏計分 (Bishop score)  $\geq 6$  分，引產較可能成功  
(B)使用催產素 (oxytocin) 會增加排尿量，需觀察輸出入液量  
(C)前列腺素主要是刺激血管平滑肌，促使子宮規律收縮  
(D)若胎位不正時建議採人工破水引產
- 16 產婦於第三產程後，依醫囑施打宮縮藥物 (Methergine<sup>®</sup>, Ergonovine)。護理師於下列何種情況需停止給藥？
- (A)主訴全身發熱  
(B)血壓 150/100 mmHg  
(C)呼吸不規則  
(D)脈搏 68~72 次/分
- 17 胎兒預估體重 3200 公克，胎位 (Fetal Position) 為枕後位 (OP)，下列敘述何者正確？①子宮收縮力比較弱 ②第一產程時間較長 ③先露部下降較快 ④子宮頸擴張較慢
- (A)①②  
(B)①③  
(C)②③  
(D)②④
- 18 李女士 G<sub>3</sub>P<sub>0</sub>，已入院待產 12 小時。她說：「我好想用力哦！」，此時護理師最佳的評估是下列何者？
- (A)先幫妳內診，了解目前狀況是否適合用力  
(B)這是待產正常的感覺，可以側躺比較舒服  
(C)這表示即將要生產了，現在立刻送妳進產房  
(D)現在深吸一口氣，朝著陰道方向用力 10 秒鐘

- 19 黃女士 G<sub>1</sub>P<sub>1</sub>，陰道生產，第一天親子同室時，仔細的觀察新生兒並詢問其外觀特性，此時護理師的反應何者最為適當？
- (A)詢問她對親子同室的看法及新生兒像誰 (B)儘快教導她如何照顧新生兒及哺餵母乳  
(C)讓她有充分的時間認識及熟悉新生兒 (D)建議她避免抱新生兒，以免子宮下垂
- 20 有關母乳哺育的護理指導，下列何者正確？
- (A)成熟乳的後奶較前奶含較多的脂肪內容物 (B)生理性黃疸是哺乳的禁忌  
(C)初乳含有很多的脂肪，所以熱量很高 (D)母乳中酪蛋白與乳清蛋白的比例較牛乳高
- 21 協助產婦產後第一次下床活動，須優先進行何項護理評估？
- (A)生命徵象 (B)子宮收縮 (C)小便自解 (D)乳汁分泌
- 22 王女士採陰道生產，問護理師：「我什麼時候可以裝子宮內避孕器？」下列回答何者正確？
- (A)產後隨時可以 (B)產後 4~6 週 (C)月經來潮時 (D)月經來前 1 週
- 23 有關產後腸蠕動功能的評估，下列何者錯誤？
- (A)以聽診器在腹部的四個象限評估 (B)正常的腸蠕動音為每分鐘 5 至 34 次  
(C)叩診時出現鼓音表示腸蠕動良好 (D)產後腹壓減少會減緩腸蠕動
- 24 林女士採陰道生產，會陰四度裂傷。在產後第 2 天可以教導她執行何項產後運動？
- (A)膝胸臥式運動 (B)乳（胸）部運動 (C)抬腿運動 (D)仰臥起坐
- 25 王女士為第二胎，採陰道生產，新生兒體重 3980 公克，抱怨子宮收縮痛，護理師評估子宮收縮呈堅硬狀態。有關產後痛的說明，下列何者錯誤？
- (A)疼痛是因子宮產生間歇性收縮所致 (B)經產婦會較初產婦子宮收縮疼痛明顯  
(C)新生兒較大者子宮收縮痛會較明顯 (D)子宮收縮疼痛感通常會持續 3 週
- 26 承上題，提供王女士產後痛的護理措施，下列何者為宜？
- (A)教導持續按摩子宮 (B)下腹部冰敷 (C)教導深呼吸 (D)依醫囑給與子宮收縮劑
- 27 林小妹，出生 2 個月，體重 5 公斤，每 4 小時餵食配方奶一次，請問每次應餵食多少 c.c.？
- (A) 120 (B) 150 (C) 180 (D) 210
- 28 有關新生兒呼吸系統之敘述，下列何者錯誤？
- (A)因內在刺激影響主動脈與頸動脈之接受器傳導到呼吸中樞引發呼吸  
(B)陰道生產較剖腹生產的新生兒易發生短暫的呼吸窘迫  
(C)因外在環境溫度刺激傳導到呼吸中樞引發呼吸  
(D)表面張力素可預防肺部塌陷
- 29 有關女性新生兒生殖器之成熟度評估，下列何者最成熟？
- (A)大陰唇覆蓋陰蒂及小陰唇 (B)陰蒂及小陰唇均突出  
(C)大陰唇變大及小陰唇變小 (D)陰蒂突出及小陰唇平坦
- 30 有關新生兒黃疸的敘述，下列何者正確？
- (A)生理性黃疸於出生 24 小時內出現，1 週左右達到高峰，然後逐漸下降  
(B)多數新生兒黃疸是屬於母乳性黃疸，建議應停餵母乳，改用母乳代用品  
(C)足月兒生理性黃疸發生率低於早產兒發生率  
(D)因 Rh 或 ABO 血型不合所發生的溶血，是導致生理性黃疸的主因

- 31 有關糖尿病婦女於妊娠期間護理措施之敘述，下列何者正確？  
(A)監測胰島素的需要量，若需要量未隨孕程增加，表示飲食計畫成效佳  
(B)避免夜裡發生高血糖症，睡前點心不可含碳水化合物  
(C)妊娠末期可藉由每週一次無壓力試驗，來確認胎盤功能  
(D)由羊水中卵磷脂與抱合髓磷脂之比值，確認胎兒有無神經管缺損問題
- 32 有關孕婦缺鐵性貧血之敘述，下列何者錯誤？  
(A)新生兒出生後採延遲斷臍  
(B)補充鐵劑應於飯前服用以利吸收  
(C)鐵劑可與維生素 C 同時服用以利吸收  
(D)鼓勵多攝取紅色肉類及深綠色蔬菜
- 33 有關妊娠糖尿病的敘述，下列何者錯誤？  
(A)採飲食控制或合併 insulin 使用  
(B)易發生胎兒畸形或巨嬰  
(C)宜控制糖化血色素在 7.5%以下  
(D)孕期高血糖常導致酮酸中毒症
- 34 下列何者為嚴重產後出血的徵象？  
(A)收縮壓與舒張壓均下降 15 mmHg  
(B)心跳次數為 60 次／分  
(C)失血超過 1000 c.c.  
(D)體溫為 100.6°F
- 35 下列何者為罹患乳癌的高危險群？①長期使用雌激素及黃體激素 ②母乳親餵 ③維持身體質量指數 (BMI) 於 23 ④從未懷孕  
(A)①② (B)③④ (C)①④ (D)②③
- 36 有關子宮移位之敘述，下列何者錯誤？  
(A)最常見為前傾  
(B)因骨盆支持結構無力所致  
(C)鼓勵採膝胸臥式  
(D)比較不容易受孕
- 37 最常導致婦女泌尿道感染的病原體為何？  
(A)大腸桿菌 (B)白色念珠菌 (C)梅毒螺旋體 (D)陰道鞭毛滴蟲
- 38 有關生殖器疱疹之敘述，下列何者正確？  
(A)大多為第一型單純疱疹病毒  
(B)可以哺餵母乳  
(C)懷孕 20 週以後感染會造成畸胎  
(D)宜採陰道生產
- 39 晚期子宮頸癌病人接受放射線治療及 Cisplatin 化學治療後感覺耳鳴及聽力喪失，下列敘述何者錯誤？  
(A)教導病人使用手套或圍巾避免冷的刺激  
(B)嚴重時需降低化學治療藥物劑量  
(C)此症狀為放射線治療導致細胞 DNA 鍵斷裂  
(D)此症狀為因化學治療而引起的周邊神經性病變
- 40 有關陰道正常分泌物的敘述，下列何者錯誤？  
(A)主要功能是濕潤陰道  
(B)反應陰道生態環境平衡的指標  
(C)又稱為白帶 (leukorrhea)  
(D)經期前或孕期時量會減少
- 41 兒科護理師的角色和功能，下列敘述何者錯誤？  
(A)了解各年齡層兒童的正常生長發育過程  
(B)了解國家對嬰幼兒保健的政策發展  
(C)促進 12 歲以下兒童的身體健康為主  
(D)依據研究實證結果改善兒童與家庭的照護
- 42 衛生福利部國民健康署，2013 年提倡嬰幼兒健康促進及保護計畫目標，針對 1~14 歲兒童之目標，期望減少那一項之死亡率？  
(A)兒童重症腸病毒 (B)先天代謝性異常 (C)意外事故及傷害 (D)呼吸系統疾病

- 43 幼兒長期大量接觸鉛，導致鉛中毒所產生的合併症，下列那一項最為嚴重且會造成不可逆的傷害？  
(A)中樞神經系統病變 (B)吞嚥困難、腹瀉 (C)紅血球過多 (D)呼吸衰竭
- 44 執行嬰兒心肺復甦術時，下列何者錯誤？  
(A)於兩乳頭連線中央按壓 (B)使用兩手指進行按壓  
(C)按壓深度約 4 cm (D)按壓速率約每分鐘 100 次
- 45 廷廷，4 歲，自前年冬天開始時常出現流鼻血現象，有關流鼻血時的護理指導，下列何者不適合？  
(A)協助維持頭向前傾的姿勢 (B)鼓勵將鼻血吞下而不要擤出  
(C)捏緊鼻樑加壓約 10 分鐘 (D)用冷毛巾敷於鼻樑上協助止血
- 46 小傑，9 歲，罹患先天性心室中膈缺損 (VSD)，此次利用暑假期間安排到醫院做心導管檢查，檢查後下列何項是小傑最大的壓力源？  
(A)擔心暑假作業寫不完 (B)擔心不能跟朋友一起玩  
(C)擔心身體受傷及疼痛 (D)擔心禁食及身體活動受限
- 47 小銘，2 歲 6 個月，在接受丹佛 II 發展測驗 (DDST-II) 前，護理師向母親解釋進行此測驗的主要目的，除精細及粗動作的評估之外，還包含下列何者？  
(A)氣質及認知發展程度 (B)記憶及環境適應能力  
(C)性別及自我概念的發展 (D)社會適應及語言的發展
- 48 筱華，5 歲，在幼兒園吃完午餐時，會模仿老師收拾餐盒，此行為表現依據艾瑞克森 (Erikson) 的理論，她的發展屬於何階段？  
(A)自主性 (autonomy) (B)主動進取 (initiative) (C)勤勉感 (industry) (D)認同感 (identity)
- 49 李小妹，4 歲，在幼兒園上課時，經常是笑口常開，對於新同學與老師、玩具或活動均可以很快地接受，此行為表現為嬰幼兒氣質評估中的那一種項目？  
(A)趨避性 (B)反應閾 (C)堅持度 (D)反應強度
- 50 為學齡前期兒童執行侵入性治療時，下列護理措施何者錯誤？  
(A)先讓病童認識給予治療的醫護人員  
(B)詳細解釋治療措施或解釋身體功能  
(C)在注射後以膠帶貼住注射部位  
(D)讓病童參與治療措施，給予選擇機會，以增加其自我控制感
- 51 嬰幼兒疼痛評估，不包括下列那一項？  
(A)臉部表情 (B)呼吸型態 (C)肢體動作 (D)意識程度
- 52 小維，自然產出生的足月兒。出生後的第二天，小維媽媽親餵母乳時發現小維皮膚呈現深黃色，血液檢驗報告其總膽紅素值 (Total Serum Bilirubin) 為 12 mg/dL。護理師初步的護理評估及判斷為何？  
(A)小維為嚴重的病理性黃疸，需換血治療 (B)小維可能會有不可逆的核黃疸腦部疾病  
(C)小維有母乳性黃疸，建議停止哺餵母乳 (D)小維有生理性黃疸，為新生兒常見的問題
- 53 小萱，出生兩天的早產兒，曾有幾次呼吸暫停的現象，現在小萱的呼吸暫停警鈴響了，下列護理措施何者正確？  
(A)以手掌輕揉背部 (B)抽吸小萱的口鼻 (C)提供高濃度氧氣 (D)直接讓小萱俯臥
- 54 文華，9 歲，罹患淋巴癌末期，目前已轉移至骨頭，主訴右髖骨處很痛，經評估疼痛強度為八分，有關疼痛的護理措施，下列何者較為適當？  
(A)依醫囑給予口服 Tintin，並使用冰枕冰敷右髖骨處  
(B)依醫囑給予口服 Ibuprofen，並使用熱水袋熱敷右髖骨處  
(C)依醫囑給予肌肉注射 Demeral，並按摩右髖骨處  
(D)依醫囑給予靜脈注射 Morphine，並以枕頭支托右髖骨處

- 55 有關協助雙親面對新生兒死亡，下列護理措施何者最適當？  
(A) 為避免雙親與新生兒有過度依附，建議雙親在新生兒瀕死前，減少跟新生兒相處時間  
(B) 向雙親解釋新生兒如果還活著，可能會有發展遲緩的問題，死亡對新生兒而言比較不受苦  
(C) 確保雙親一定要在新生兒死後看他一眼，以減少父母親否認的情緒  
(D) 在新生兒瀕死前後，提供雙親機會抱抱自己的新生兒及鼓勵雙親與新生兒說話
- 56 鐘小弟，妊娠週數 31 週又 5 天出生，體重 1560 公克，現出生後第三天開始由口餵食，下列何者不是他在進食過程中的壓力性行為線索 (feeding stress cues)？  
(A) 吸不到 5 分鐘就不吸奶，睡著了  
(B) 呼吸喘，且鼻翼煽動，心跳變慢  
(C) 噎奶，咳嗽，膚色改變  
(D) 會因為呼吸而中止吞嚥
- 57 小明為小一學生，日前罹患水痘，校護對於小明返校上課的建議，下列何者適當？  
(A) 出疹後 5~6 天  
(B) 疹子化膿後 5~6 天  
(C) 疹子結疤乾燥後 7~8 天  
(D) 使用抗生素後 7~8 天
- 58 小明，1 歲半，診斷為川崎氏症而住院治療。醫囑給予小明高劑量 Aspirin 100 mg/kg/day，及靜脈注射免疫球蛋白 (intravenous immune globulin) 2g/kg。下列護理指導內容，何者不適當？  
(A) 小明目前服用 Aspirin 為高劑量，目的為抗發炎與抑制血小板凝集  
(B) 給予病童換上透氣涼爽衣物，保護下肢水腫處，維持皮膚清潔、乾燥  
(C) 注射免疫球蛋白之後 3 個月，小明就可以接種任何疫苗  
(D) 小明半年內至少每個月一次宜接受心電圖檢查，以早期發現心臟合併症
- 59 下列那一種對象是接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR) 的禁忌者？  
(A) 1 年前曾輸過血者  
(B) 靜脈注射高劑量免疫球蛋白 11 個月以上者  
(C) 4 個月前肌肉注射 B 型肝炎免疫球蛋白者  
(D) 預備 3 個月內懷孕的婦女
- 60 小明，3 歲，發燒 38.5°C，哭鬧不安，胃口不好，活動力差，至小兒急診求治，診斷為急性鼻咽炎，有關小明的照護措施，何者較不適當？  
(A) 鼓勵病童多喝水或果汁及臥床休息  
(B) 鼻塞引起的呼吸費力是正常現象，請父母不必擔心  
(C) 教導父母注意室內環境的通風，避免飛沫傳染  
(D) 教導兒童少用手摸鼻子、嘴巴、眼睛，以降低感染風險
- 61 有關兒童罹患黴漿菌性肺炎 (mycoplasma pneumonia) 的臨床表徵，下列敘述何者正確？  
(A) 病程進展非常快速，易出現 39°C 以上高溫  
(B) 常侵犯肺葉及肺小葉，聽診時會有呼氣末期囉音  
(C) 咳嗽明顯，痰液黏稠、量多，宜儘速痰液培養  
(D) 血清檢查可發現特定的抗體濃度升高，白血球數值可能正常
- 62 有關學童發生氣喘會出現病理生理上的變化，下列敘述何者錯誤？  
(A) 血管通透性下降、細胞浸潤、呼吸道水腫  
(B) 顆粒性白血球、淋巴球、單核球細胞增加  
(C) 呼吸急促、新陳代謝增加、呼吸性酸中毒  
(D) 咳嗽、吐氣時間延長、呼氣末期喘鳴聲
- 63 廖小妹，2 個月，罹患心室中膈缺損，因肺炎引發鬱血性心衰竭 (congestive heart failure) 而入院，下列那一項不屬於鬱血性心衰竭的臨床表徵？  
(A) 心跳過慢  
(B) 大量流汗  
(C) 四肢冰冷  
(D) 呼吸過速



- 64 凱凱，5 歲，罹患法洛氏四重畸形（tetralogy of fallot;TOF），常出現有缺氧發作（blue spells），有關缺氧發作的臨床表徵，不包括下列何者？  
(A)哭泣後出現發紺 (B)皮膚彈性減少呈黃色  
(C)鞏膜因血管之鼓大呈灰色 (D)嘴唇口腔黏膜呈現暗藍色
- 65 小華，5 歲，罹患大血管轉位（transposition of the great arteries;TGA），此次入院準備接受完全矯正手術。基於小華在心臟方面的認知，護理師應採取以下何種解釋方式較為適當？  
(A)因小華對心臟認知不足，主要以父母親對心臟的認知為護理指導的範疇  
(B)畫出人形和心臟的位置，說明手術後心臟會發出較規律清晰的蹦蹦聲  
(C)畫出心臟四個腔室的外形，並解釋手術後心臟會如何把血打出去  
(D)採開放式問題，並儘量口語化來討論靜脈、動脈及血液循環的功能
- 66 盼盼，6 歲，罹患先天性心臟病，依醫囑服用毛地黃，下列何者不是毛地黃中毒的症狀？  
(A)心跳變慢 (B)噁心、嘔吐 (C)頭痛、嗜睡 (D)抽搐、痙攣
- 67 小華，7 歲，罹患重度型  $\beta$ -海洋性貧血，定期接受輸血治療，有關其外觀的視診結果，下列敘述何者錯誤？  
(A)體型矮瘦 (B)膚色蒼白 (C)塌鼻、頭大 (D)腹部腫大
- 68 有關兒童感染人類免疫缺乏病毒（HIV）的途徑，下列何者錯誤？  
(A)由產道接觸到 HIV 帶原母親的血液及分泌物  
(B)產後經由 HIV 帶原母親的哺乳  
(C)經由 HIV 帶原者親吻兒童的臉頰  
(D)輸入被 HIV 感染的凝血因子
- 69 郭小妹，妊娠週數 39 週又 4 天，自然產娩出，有關健康新生兒篩檢之時間安排，下列敘述何者正確？  
(A)於出生滿 24 小時，或已完全由腸道進食 12 小時後  
(B)於出生滿 36 小時，或已完全由腸道進食 24 小時後  
(C)於出生滿 48 小時，或已完全由腸道進食 24 小時後  
(D)於出生滿 72 小時，或已完全由腸道進食 12 小時後
- 70 新生兒篩檢之代謝性異常疾病，若未及時治療，下列何者較不會影響智力的發展？  
(A)苯酮尿症  
(B) G-6-PD 缺乏症（Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase）  
(C)半乳糖血症  
(D)先天性甲狀腺功能低下症
- 71 章小妹，出生 3 天的足月兒，疑似罹患先天性腎上腺增生症，下列敘述何者錯誤？  
(A)由檢查血中 19-KS（19-ketosteroids）的含量做診斷  
(B)從外生殖器的觀察，不易分辨性別  
(C)在早上補充皮質酮治療，以維持正常分泌  
(D)皮質酮治療期間容易出現感染之副作用
- 72 罹患胰島素依賴型糖尿病（IDDM）的 12 歲病童，參加營養衛教課，當病童能說出下列何者，表示護理師此次衛教已經成功？  
(A)如果正餐時我不餓，我可以稍後再吃點心  
(B)如果我正餐沒吃完，我就必須馬上補充些醣類的食物  
(C)如果我正餐沒吃完，我需要注射多一點胰島素  
(D)如果我正餐沒吃完，我可以在下一餐時增加些醣類的食物

- 73 有關嬰兒吞嚥攝食的生理特性，下列敘述何者錯誤？  
(A) 新生兒是藉由吸吮反射及吞嚥反射來攝食乳汁  
(B) 嬰兒 3~4 週大時即會嘗試自主控制吞嚥動作  
(C) 嬰兒的下食道括約肌較為鬆弛故易有溢奶情形  
(D) 嬰兒 4 個月大時，自發性吸吮反射會消失
- 74 林小妹，9 歲，診斷為闌尾炎（Appendicitis）預進行盲腸切除手術。有關手術前後的護理措施，下列何者正確？  
(A) 術前持續評估疼痛型態，必要時給予口服非類固醇止痛劑（NSAID）  
(B) 持續腹部評估，若腹部肌肉有不自主收縮而僵硬如木板，疑有腹膜炎的危險  
(C) 術前宜禁食由靜脈點滴維持體液，術後試喝水無不適即可恢復進食  
(D) 術後若有引流管留置，需採平躺姿位，以利引流及防止感染逆行向上擴散
- 75 有關先天的氣管食道瘻管（Tracheoesophageal fistula）嬰兒，進行瘻管關閉及食道吻合術後之照護重點，下列敘述何者錯誤？  
(A) 需將嬰兒頭部抬高 45~60 度，以避免胃容物逆流  
(B) 使用安撫奶嘴，以免嬰兒哭泣造成胃腸壓力上升  
(C) 若鼻胃管滑脫應立即重新放置，以免胃液損及傷口  
(D) 抽吸管的長度不可超越傷口吻合處，避免吻合部位受傷
- 76 有關輪狀病毒（rotavirus）感染引起的兒童急性腸胃炎，下列敘述何者正確？  
(A) 主要藉由飛沫傳染  
(B) 糞便棄置前需經漂白水消毒  
(C) 需使用抗生素治療  
(D) 常併有上呼吸道感染
- 77 有關水腦病嬰接受腦室—腹膜分流術（V-P shunt）後的各項護理，下列敘述何者正確？  
(A) 頭圍測量方式：自枕部隆經耳垂至額頭上方  
(B) 觀察是否有噴射狀嘔吐或尖銳哭聲的發生  
(C) 協助病嬰採水平俯臥，以避免傷口受壓  
(D) 避免抱起病嬰餵奶，以防脊髓液引流過快
- 78 小明，7 歲，在練習游泳時，被同學推入泳池中，因溺水而窒息，經救生員急救後，送醫院治療，目前懷疑腦幹及延髓受損，有關小明的呼吸型態，下列何者較可能出現？  
(A) 呼吸深且快速（過度換氣型態）  
(B) 喘息呼吸與暫停呼吸交替出現（陳施氏呼吸）  
(C) 呼吸偶而會出現深且聽得到嘆息聲（喟嘆式呼吸）  
(D) 呼吸會出現不規則的穿插呼吸暫停（運動式呼吸）
- 79 小玲，出生 3 天，診斷為脊髓之脊髓膜膨出且合併有水腦症，有關其手術前的護理措施，下列敘述何者錯誤？  
(A) 維持垂頭俯臥姿勢，以利脊髓液回流  
(B) 協助其腿部呈外展，以預防髖關節脫位  
(C) 選擇質軟小孔的奶嘴餵食，以預防吞食過量空氣  
(D) 維持臀部及會陰部乾淨，以減少糞便污染膨出的囊
- 80 雷氏症候群（Reye's syndrome）早期病變的主要徵象為何？  
(A) 嘔吐  
(B) 去大腦髓質僵直  
(C) 反射消失  
(D) 過度換氣

106年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、  
心理師、護理師、社會工作師考試、106年專門職業及技術人員高等考試法醫師、  
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等 別：高等考試

類 科：護理師

科 目：精神科與社區衛生護理學

考試時間：1小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 關於精神病人轉日間住院，對病人的幫助，下列何者正確？
  - 較有開放性及自主性，可訓練病人自我管理
  - 壓力比全日住院小，病人較能配合治療
  - 人際關係簡單，不太需要應對
  - 日間病房護理師比較資深，較能掌控病人不會出錯
- 有關精神醫學第四次革新運動的敘述，下列何者正確？
  - 代表人物為瓊斯（Jones）
  - 倡導治療性社區
  - 推廣去機構化運動
  - 生物精神醫學蓬勃發展
- 心理防衛機轉中，有關潛抑作用（repression）和壓抑作用（suppression）之敘述，下列何者正確？
  - 潛抑作用（repression）和壓抑作用（suppression）都是在潛意識層面的心理活動
  - 潛抑作用（repression）和壓抑作用（suppression）都是在意識層面的心理活動
  - 潛抑作用（repression）是在潛意識層面，壓抑作用（suppression）是在意識層面的心理活動
  - 潛抑作用（repression）是在意識層面，壓抑作用（suppression）是在潛意識層面的心理活動
- 護理師於會談中詢問病人：「為什麼到醫院來？」、「就你所知，醫師為什麼開這些藥物給你？」請問是為了獲得那方面的評估資料？
  - 病人對環境的了解
  - 病人對疾病的了解
  - 病人的疾病史
  - 病人對疾病的因應能力
- 治療者詢問團體中其他成員：「大家是否有類似的感受或經驗？」請問治療者的用意為何？
  - 引導出問題的共通性
  - 重現原生家庭經驗
  - 示範社交技巧
  - 促進成員對生命本質的了解
- 病房的設計中都會擺放時鐘和月曆，主要目的在提供下列何種功能？
  - 協助自我覺察力
  - 訓練閱讀感官功能
  - 培養獨立自主行為
  - 刺激與增加現實接觸
- 記憶力分為許多層次，關於其各種檢測評估方法的敘述，下列何者正確？
  - 複誦三樣事物（three objects）主要是要評估病人的近期記憶
  - 數數字（digital span）主要是評估病人的遠期記憶
  - 最近對於家中電話、地址記不得，屬於近期記憶障礙
  - 上週發生的事情記不起來，屬於遠期記憶障礙

- 8 根據溝通分析理論 (Transactional Analysis)，護理師告訴病人：「參加活動可以幫助你增加社交技巧的能力。」病人回應表示：「我好累喔，拜託讓我休息嘛。」這是屬於何種溝通型態？
- (A)互補性 (complementary transaction)                      (B)交錯性 (crossed transaction)  
(C)清楚性 (clear transaction)                                      (D)隱祕性 (ulterior transaction)
- 9 有關環境治療的敘述，下列何項正確？①躁症病人應減低過度的環境刺激 ②監視憂鬱症病人防止自殺行為 ③提供思覺失調症病人新的認同對象 ④行為失控時即刻使用身體約束及保護隔離
- (A)①②③                      (B)②③④                      (C)①②④                      (D)①③④
- 10 在團體治療的場合中，病人表示她都睡不好，另一位病人說：「我以前也睡不好，後來準時吃藥，按時去睡，我現在就睡很好了。」有關耶隆 (Yalom) 的療效因子之敘述，下列何者最正確？
- (A)病友提供灌注希望 (instillation of hope) 的療效  
(B)發展社交技巧 (development of socializing techniques)  
(C)病友的建議是一種原生家庭經驗再現的療效  
(D)病友的建議可引導體會生存 (existential factor) 的意義
- 11 有關電氣痙攣療法 (electroconvulsive therapy, ECT) 護理照護的敘述，下列何者正確？
- (A)目前最常見的適應症為焦慮症  
(B)電流通過腦部引發痙攣，會先出現陣發性痙攣，再出現強直性痙攣  
(C)病人接受 ECT 治療者，並不需要事先洗頭，因為油垢有利於電傳導  
(D)病人接受 ECT 治療前，應確認病人排空膀胱與除去活動假牙
- 12 護理師與病人在治療性人際關係建立的過程中，工作期階段的主要任務為何？
- (A)處理病人的不信任行為                      (B)共同訂立契約及目標  
(C)共同探討彼此的感受                      (D)協助病人學習行為改變
- 13 周同學一向從容不迫，但在面臨學位資格考時，表現非常焦慮，這種情況屬於下列何種焦慮？
- (A)特質性焦慮 (trait anxiety)                      (B)慢性焦慮 (chronic anxiety)  
(C)情境性焦慮 (situational anxiety)                      (D)重度焦慮 (severe anxiety)
- 14 護理師照顧吳太太時有強烈的敵意，與之互動時顯不耐煩，覺得對方很像自己的婆婆，而難以和吳太太建立護病關係，有關這種關係之敘述，下列何者正確？
- (A)情感轉移                      (B)情感反轉移                      (C)試探性行為                      (D)阻抗作用
- 15 王先生診斷雙相情緒障礙症，30 歲。王先生住院後，不斷的投書給醫院的院長，對病房設施提出多項建議，護理師的處置下列何者最適宜？
- (A)了解王先生的症狀行為，予以適當的討論                      (B)向院長解釋王先生的目前疾病狀況  
(C)尊重王先生的權利，協助其達成所提出建議                      (D)肯定及鼓勵王先生對病房的關心行為
- 16 承上題，王先生容易受環境刺激，而變得更加躁動不安，下列措施何者最適宜？
- (A)安排王先生較簡單、安靜的空間  
(B)為避免被干擾與干擾他人，請王先生在保護室內  
(C)鼓勵王先生帶耳機以阻隔外界聲音的刺激  
(D)鼓勵王先生參與團體心理治療

- 17 減少阿茲海默症病人之問題行為發生的護理處理，下列何者最適宜？  
(A)尊重病人自主性 (B)安排病人安靜環境 (C)改善病人記憶力 (D)安排病人熟悉環境
- 18 譫妄病人最常出現的幻覺為下列何者？  
(A)視幻覺 (B)嗅幻覺 (C)聽幻覺 (D)觸幻覺
- 19 臨床上採用 Aricept 作為治療阿茲海默症初、中期的記憶障礙，其主要作用機轉為何？  
(A)改善腦部血循環 (B)抑制抗膽鹼酯酶  
(C)增加乙醯膽鹼代謝 (D)改善體液電解質濃度
- 20 黃先生，診斷思覺失調症，表示自己是調查局南機組幹員，被派到公司臥底，最近他查到公司與某位政府高層有進行一項見不得光的交易，所以被下降頭，護理師的反應下列何者最適當？  
(A)你好像很害怕，可是就我所知並沒有下降頭這件事  
(B)向黃先生提出質疑「調查局有南機組嗎？」  
(C)政治新聞對你影響很大  
(D)傾聽黃先生的陳述
- 21 有關處於「譫妄」(delirium) 狀態病人的護理目標，下列何者應優先處理？  
(A)增加感官刺激活動，以緩和病人緊張之情緒 (B)維持病人生命徵象之穩定，促進康復  
(C)病人能參與定向感訓練，增進認知功能 (D)增進病人的病識感，以配合醫療
- 22 長期大量使用某種物質，在停用或減用後，會出現渴藥、不安、流淚、發汗、瞳孔放大、虛弱無力、噁心、腹痛、骨頭酸痛、失眠等，最可能是下列何種濫用物質的戒斷反應？  
(A)鴉片類 (Opioids) (B)天使塵 (PCP)  
(C)大麻類 (Cannabinoids) (D)K 他命 (ketamine)
- 23 有關自殺防治的敘述，下列何者正確？  
(A)自殺不具有模仿效應 (B)自殺後的再自殺風險通常低  
(C)有家族自殺行為是高危險群 (D)自殺是毫無預警的
- 24 老年失智症病人會出現黃昏症候群 (sundown syndrome)，係指下列何種現象？  
(A)病人黃昏後視覺產生變化，常出現幻覺 (B)病人夜間生理時鐘受損，睡眠變差，入睡困難  
(C)病人黃昏後混亂、激動之情形惡化 (D)病人夜間後開始昏昏欲睡，干擾程度降低
- 25 初次住院的王先生表示：「我一直聽到有個女生的聲音在我的耳邊罵我，我真的好痛苦！」護理師的回應，下列何者最適當？  
(A)「我可以感受你現在的痛苦。」 (B)「這個聲音是幻聽。」  
(C)「別理它就好了。」 (D)「罵回去就不會痛苦了。」
- 26 下列何種藥物濫用會因長期嗅吸造成鼻中膈穿孔、肺受損及靜脈注射感染疾病？  
(A)古柯鹼 (B)安非他命 (C)K 他命 (D)大麻
- 27 有關強迫症之敘述，下列何者最正確？  
(A)出現強迫行為的兒童知道其強迫行為是過度且不合理的  
(B)病人常用的防衛機轉是合理化  
(C)必須結合藥物及行為治療  
(D)最常出現在中年人
- 28 有關物質使用障礙症病人之照護過程，下列何者最正確？  
(A)在「接觸期」，強調治療性關係的建立，不宜改變日常生活作息  
(B)在「說服期」，宜多運用面質技巧，迫使病人面對自己的困境，此階段並不宜使用動機晤談法  
(C)在「積極治療期」，宜加強病人法治觀念，改善交友  
(D)在「預防再濫用期」，宜加強行為改變，確認危險因子，以促進預防措施

- 29 陳太太在一次大地震中，親眼目睹自己的家園及女兒被海嘯吞噬，而自己也因躲避海嘯而身體多處受傷。事發後，陳太太出現反覆夢見自己被海嘯吞噬的惡夢，不想參加任何活動，對未來抱持悲觀的心態，且不願談論與海嘯有關的話題，出現失眠、易怒等症狀，症狀持續一個月仍未改善，請問陳太太最可能的診斷為何？
- (A)創傷後壓力症 (post-traumatic stress disorder) (B)恐慌症 (panic disorder)  
(C)急性壓力症 (acute stress disorder) (D)解離症 (dissociative disorder)
- 30 承上題，護理師提供陳太太的護理措施中，下列何者最適當？①漸進引導回顧創傷過程 ②鼓勵陳太太面對現實，不要沉浸悲傷中 ③適時陪伴及傾聽 ④運用團體治療過程互相支持
- (A)①②③ (B)①③④ (C)①②④ (D)②③④
- 31 社區心理衛生的第二級預防工作，應如何推行？
- (A)提供社區精神病人門診、住院與急診的服務 (B)進行衛生教育，心理健康促進活動  
(C)提供慢性病人職業訓練與就業轉銜服務 (D)協助病人享有身心障礙者應有的權益福利
- 32 依據民國 102 年修正之精神衛生法，個案接受強制社區治療時，初始階段以幾日為限？
- (A) 7 (B) 30 (C) 180 (D) 365
- 33 有關自殺的敘述，下列何者錯誤？
- (A)蘇利文 (Sullivan) 提出人際理論，認為自殺是個體處理人際衝突失敗的行為結果  
(B)神經傳導物質血清素 (serotonin) 過多時會產生憂鬱及自殺行為  
(C)得雷克 (Drake) 認為：自殺的強度與憂鬱症無關，而與無助及無望感的程度有關  
(D)史奈曼 (Shneidman) 指出：自殺者的認知程度是自我互相矛盾
- 34 下列何者屬於精神衛生工作初級預防的護理功能？
- (A)轉介社區機構 (B)提供衛生教育 (C)提供職業訓練 (D)提高藥物遵從性
- 35 下列何者是全球積極推動「社區心理衛生」的原因？①人們對於精神病人人權問題的重視 ②精神疾病治療模式的改變 ③機構化運動的觀念 ④精神藥物的發明與應用
- (A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 36 王先生 44 歲，原於山上種植咖啡，去年遭受嚴重風災導致咖啡園全毀及妻子去世之雙重打擊，下列何者為首要的照護措施？
- (A)減少王先生表達對創傷事件的感覺，以免衍生自責及導致創傷後壓力症  
(B)減少王先生的環境操控，僅保留現有支持系統，避免多餘的刺激或壓力  
(C)著重王先生的問題如何影響他眼前的生活，運用其優點及支持系統，提供立即性的支持渡過危機  
(D)依卡普蘭危機理論，4~6 個月之內王先生的心理最易受傷害，也最能接受幫助，因此處置時間以 4~6 個月為原則
- 37 承上題，王先生面對此雙重打擊，有關其反應與調適的敘述，下列何者正確？
- (A)王先生有可能因為面對重大變化，慣用的問題解決技巧不足以用來解決日常生活問題，而產生中年男子的成熟性危機  
(B)王先生的雙重打擊應會導致創傷後壓力症，需要立即請精神科醫師介入治療  
(C)亞吉勒拉 (Aguilera) 的理論，王先生若對事件有正向理解、有效因應機制、足夠資源支持就會減少危機的發生  
(D)王先生極力拒絕專業協助，他應有自己的因應方式，我們不需擔心

- 38 張先生 70 歲，獨居，因為面臨居住幾十年的違章建築要被拆除，張先生一直以死抗議，這天因為表示要自焚，被鄰居送來精神科病房住院進行自殺防範，關於自殺防範護理措施，下列何者最適宜？
- (A) 依據評估張先生的自殺危險程度，護理師應採取每 15 分鐘密切觀察
  - (B) 依據評估張先生的自殺危險程度，建議張先生請看護，採一對一陪伴
  - (C) 協助張先生與政府單位溝通，延緩拆除居所
  - (D) 儘早進行安置張先生計畫，建議轉慢性病房
- 39 中風臥床多年的周爺爺，兩週前在睡眠中與世長辭，周奶奶正處於悲傷急性期的情境中，在這個階段，照護喪偶的周奶奶，下列那一事項並不急於在此時進行？
- (A) 鼓勵周奶奶表達其感覺與想法，並給予情緒上之支持
  - (B) 鼓勵周奶奶積極參與自我成長的活動
  - (C) 評估周奶奶是否出現自我傷害的意念或行為
  - (D) 協助周奶奶維持正常的飲食與生活作息
- 40 一位 14 歲飲食障礙症病患表達：「我之前曾一度吃了麵包變得很胖，因此我現在必須嚴禁吃任何碳水化合物以免發胖。」根據認知扭曲的概念，此種表述為下列何種認知扭曲？
- (A) 控制的謬誤 (control fallacies)
  - (B) 情緒推理 (emotional reasoning)
  - (C) 讀心術 (mind reading)
  - (D) 過度推論 (over generalization)
- 41 公民可透過下列何種團體力量對關鍵重要人物 (stakeholders) 進行遊說與監督的工作？
- (A) 行政體系
  - (B) 立法機關
  - (C) 考試機關
  - (D) 利益團體
- 42 有關多重抗藥性結核病 (MDR-TB) 的描述，下列何者正確？①結核菌培養為陽性，且同時對於 isoniazid 與 rifampin 有抗藥性 ②結核菌培養為陰性，對任何 fluoroquinolone 藥物有抗藥性者 ③因為藥物副作用以致症狀無法明顯改善 ④進階都治計畫 (DOTs Plus) 能更全面監控多重抗藥性結核病人
- (A) ①②
  - (B) ②③
  - (C) ③④
  - (D) ①④
- 43 當社區衛生護理師的介入是針對物理環境 (physical environment) 的健康決定因子時，下列何者不是該社區適當的健康狀況指標？
- (A) 空氣品質
  - (B) 水的品質
  - (C) 自殺率
  - (D) 住家
- 44 在社區整合式篩檢中，利用糞便潛血檢查以篩檢出可能罹患大腸癌的社區居民，在三段五級預防工作中屬於那個段級？①第一段 ②第二段 ③第三段 ④第一級 ⑤第二級 ⑥第三級
- (A) ①④
  - (B) ②⑤
  - (C) ③⑥
  - (D) ②⑥
- 45 某社區正流行登革熱，在 4 月 1 日調查 1,000 人，其中有 100 人證實已被感染到登革熱，在 6 月 1 日調查同一群人口，又另確認出 100 人感染到登革熱，有關此社區的登革熱流行狀況，下列何者正確？
- (A) 點盛行率為 20%
  - (B) 期盛行率為 20%
  - (C) 累積發生率為 10%
  - (D) 累積盛行率為 20%
- 46 有關流行病學中所謂的「流行病」，下列何者正確？
- (A) 疾病的發生數目比前一年多
  - (B) 疾病的發生數目，超過正常期望值
  - (C) 疾病的發生數目，超過所有存在的病例數
  - (D) 疾病的死亡人數，超過過去死亡人數

- 47 下列何者為申請全民健康保險給付的居家護理服務之收案程序？  
(A)只須由醫師評估並開立「居家照顧醫囑單」，由醫院之居家服務部門收案  
(B)社區個案符合居家照護收案條件者，可向設有居家護理服務部門申請，即可由居家護理師安排照護  
(C)符合居家照護收案條件者，由照護機構向衛生福利部中央健康保險署提出申請，並經審查通過者，可接受給付，若不符者，應予拒絕  
(D)除了醫師開立「居家照顧醫囑單」，也要檢具居家照護申請書，再由醫師及護理師評估後收案
- 48 造成家庭暴力與虐待事件的社會因素包括那些？①工作壓力 ②家庭管教方式 ③媒體學習 ④醫療制度  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 49 根據行政院環境保護署的定義，酸雨指的是雨水酸鹼值（pH）低於多少？  
(A) 5.5 (B) 6.0 (C) 6.5 (D) 7.0
- 50 下列何種細菌最易污染生鮮魚貝類，導致食物中毒？  
(A)腸炎弧菌 (B)肉毒桿菌 (C)沙門氏桿菌 (D)金黃色葡萄球菌
- 51 張先生為中度失智個案，常有走失、健忘、重複問時間、焦慮等問題，社區衛生護理師家訪時對家屬的建議，下列何者最不適當？  
(A)讓張先生戴有姓名及電話的手鍊 (B)變動環境擺設與佈置避免環境單調  
(C)在大門加裝另一門栓或密碼鎖 (D)將時鐘及日曆掛於醒目處
- 52 全民健康保險為自給自足、自負盈虧之社會保險，以隨收隨付制維持短期財務平衡，其收入來源下列何者正確？①保險對象、雇主及政府共同分擔之保險費 ②菸品健康福利捐 ③公益彩券盈餘分配之收入 ④企業捐款  
(A)僅① (B)僅①② (C)僅①②③ (D)①②③④
- 53 吳先生因吞嚥功能受損，近日接受胃造口手術後返家，護理師家訪時，下列何種方式最能確認吳太太對吳先生執行胃造口換藥的能力？  
(A)詢問吳太太每日換藥次數 (B)觀察吳先生傷口情形  
(C)評估吳家換藥敷料及衛材儲存數量 (D)請吳太太實際操作換藥過程
- 54 家庭護理過程步驟的順序，下列何者正確？①動員資源解決問題 ②家庭及個人健康資料收集 ③確認家庭及個人健康問題 ④與家庭共同設立照護目標 ⑤評估執行成效 ⑥決定優先順序  
(A)①②③④⑥⑤ (B)②③④⑥①⑤ (C)③②④①⑥⑤ (D)④①②③⑥⑤
- 55 全民健康保險對妊娠第三期（29 週後）孕婦最多給付幾次產前檢查？  
(A) 4 次 (B) 5 次 (C) 6 次 (D) 8 次
- 56 透過舉辦健康講座，教導員工如何預防慢性病，這是屬於 1986 年渥太華憲章中的那一項策略？  
(A)建立一個健康的公共政策 (B)創造有益健康的環境  
(C)發展個人保健技能 (D)強化社區組織和功能
- 57 有關兒童期肥胖的處置，下列何者錯誤？  
(A)多攝取高纖飲食 (B)鼓勵節食 (C)減少攝取高脂食物 (D)指導適當活動
- 58 有關我國長期照顧十年計畫 2.0 喘息服務的描述，下列何者正確？  
(A)重度失能者每年最高補助 14 天 (B)可選用居家、機構與日間照護型喘息服務  
(C)每日最高補助經費為 1,000 元 (D)輕度失智症者尚未納入服務對象



- 59 執行出院準備服務時，首先應完成：  
(A)評估病人照護需求 (B)擬定照護計畫 (C)篩選高危險群 (D)服務協調與安排
- 60 有關慢性病的特性，下列何者錯誤？  
(A)早期發現可避免疾病惡化 (B)須終生控制，無法根治  
(C)初期通常沒有明顯症狀 (D)通常不會造成殘障與機能不全
- 61 骨質疏鬆症的危險因子，下列何者錯誤？  
(A)高齡 (B)身材和體格特別高大  
(C)飲酒過量 (D)家庭成員有人罹患骨質疏鬆症
- 62 生命統計中，常用到比例（ratio），下列何者不包含在內？  
(A)性別比 (B)扶老比 (C)依賴人口指數 (D)發生率
- 63 有關平均餘命之敘述，下列何者錯誤？  
(A)指假設目前各年齡層的死亡率不變，則該年各年齡層預期將可再生存的年數  
(B)為一項真實統計數值  
(C)統計學上是以零歲的平均餘命作比較  
(D)我國平均餘命逐年上升中
- 64 下列何者是社區的無形資源？①社區人力 ②社區意識 ③社區文化規範 ④社區的凝聚力 ⑤社區物力  
(A)①②③ (B)②③④ (C)②④⑤ (D)③④⑤
- 65 有關 Anderson 和 McFarlane（2008）以社區為夥伴的健康評估模式，下列何者正確？  
(A)強調社區評估過程中可以使社區民眾增能（empower）  
(B)強調由護理師主導，民眾是主要學習者  
(C)強調社區內部八大次系統的互動關係，較不重視與社區外的互動  
(D)評估後的資料由專業人員進行分析，並決定計畫的優先順序
- 66 排定社區衛生護理問題的優先順序時，下列何者應優先處理？  
(A)社區老人對失智症的了解不足 (B)社區婦女不願意參與乳房攝影檢查  
(C)社區發現本土性登革熱疑似個案 (D)社區戒菸門診資源不足
- 67 有關群體（aggregates）的說明，下列何者錯誤？  
(A)社區是由許多群體所組成  
(B)社區內的成員通常屬於多樣群體  
(C)群體的定義是一群人，且這群人分享一個或更多的個人或環境特質  
(D)以群體為基礎的社區健康服務，較不符合成本效益
- 68 小李食用真空包裝豆乾，半天後出現噁心、嘔吐、吞嚥困難及口乾、看不清楚、呼吸漸喘等症狀，最有可能是下列何種狀況？  
(A)金黃色葡萄球菌食物中毒 (B)沙門氏桿菌食物中毒  
(C)吃到基因改良食物造成不適 (D)肉毒桿菌食物中毒

- 69 衛生福利部為改善山地離島地區醫療不足與就醫不便問題，規劃有能力、有意願的醫療院所，至山地離島地區提供定點或巡迴醫療服務，此計畫名稱為何？  
(A)地方養成醫事人員培育及返鄉服務計畫  
(B)原住民醫療或社會福利資源計畫  
(C)部落及社區健康營造計畫  
(D)全民健康保險山地離島地區醫療效益提升計畫 (Integrated Delivery System, IDS)
- 70 配合 0~7 歲兒童的疫苗接種時程，我國全民健康保險規劃補助幾次的兒童預防保健門診？  
(A) 5 (B) 7 (C) 10 (D) 14
- 71 某生參加大隊接力後，突冒冷汗、手發抖，護理師接獲通知，前往現場處理時，應該攜帶下列那些設備至現場？①冰敷袋 ②血壓計 ③彈性繃帶 ④血糖機 ⑤葡萄糖片  
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)②④⑤
- 72 某高噪音作業的員工其特殊健康檢查結果出現第三級管理，職業衛生護理師的立即處理為何？  
(A)按規定保存紀錄即可 (B)請職業醫學專科醫師評估  
(C)幫員工申請職災補償 (D)將員工調離該工作場域
- 73 某工廠員工人數共 238 人，其中從事特別危害健康作業人數為 126 人，依據勞工健康保護規則，該工廠需聘任專任護理師多少人？  
(A) 0 人 (B) 1 人 (C) 2 人 (D) 3 人
- 74 我國長期照顧服務法，所指之長期照顧對象是指身心失能持續達多久以上的人？  
(A) 3 個月 (B) 6 個月 (C) 12 個月 (D) 18 個月
- 75 慢性病危險群個案管理需要完整的計畫與防治步驟，其中最優先且重要的是：  
(A)追蹤個案的檢查與治療 (B)提升個案對疾病的認知  
(C)運用篩檢與檢查發現個案 (D)早期治療以保持個案正常功能
- 76 社區衛生護理師為弱勢個案族群爭取所需服務，促成相關政策之立法，是屬於何項角色的發揮？  
(A)倡議代言人 (B)溝通協調者 (C)個案管理者 (D)策略發展者
- 77 某長者預約社區內醫療院所的老人健康檢查，但名額已滿。這代表該社區的老人健康檢查資源的那一項特性不足？  
(A)可近性 (accessibility) (B)可用性 (availability)  
(C)可靠性 (accountability) (D)可負擔性 (affordability)
- 78 教導糖尿病個案如何使用鏡子來觀察腳底皮膚狀況，讓個案可以回去自行觀察，下列何種教學方法最適合？  
(A)講述法 (B)小組討論 (C)價值澄清法 (D)示範教學法與回示教
- 79 邀請名人或藝人擔任代言人，促進民眾篩檢意願，此種策略根據健康信念模式是屬於何因素？  
(A)知識經驗的結構因素 (B)行動線索  
(C)預防行為利益性 (D)疾病罹患性
- 80 在關懷據點開設健康瑜珈班，過程中除了需考慮參加的民眾，還可能需要協調開班時間與地點等問題。以上若依據比提 (Beattie) 的健康促進模式，過程中較適合使用何種策略？  
(A)健康政策與支持性環境 (B)健康說服  
(C)個人諮詢 (D)社區組織發展